

En la mayoría de los países en desarrollo, las infecciones de transmisión sexual (ITS) ocupan el segundo lugar entre las causas de enfermedad de las mujeres en edad reproductiva, después de aquellas relacionadas con la maternidad. La prevención y el tratamiento de las ITS constituyen un mecanismo de intervención que mejora la salud pública, dado el grado de morbilidad y mortalidad que causan, y evita la transmisión del Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

El comportamiento del VIH y del Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en el Perú es el de una epidemia concentrada, así el primer caso diagnosticado de SIDA en el Perú fue en el año 1983 y hasta el 31 de diciembre de 2010, se han reportado 28 mil 445 casos de SIDA y 45 mil 876 casos notificados de VIH^{1/} pero se estima que más de 100 mil personas estarían viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana hasta el año 2040. La magnitud del problema, la rápida propagación del VIH/SIDA, la no existencia de cura para la enfermedad y la relación entre ITS y VIH confirman la importancia de monitorear el conocimiento de la población sobre la transmisión, prevención y percepción de los riesgos.

El cuestionario individual de la ENDES 2011 sigue incluyendo una sección, con preguntas previamente evaluadas y mejoradas, para indagar sobre el conocimiento general de las mujeres acerca de las infecciones transmitidas sexualmente: conocimiento de las distintas infecciones, si han adquirido infecciones en los 12 meses anteriores a la entrevista y, en caso positivo, lugar y persona donde buscó tratamiento o consejo y comunicación con el compañero sexual. Con relación al VIH/SIDA, se indagó sobre el lugar donde una persona puede hacerse la prueba para saber si tiene el virus que causa la enfermedad, qué debe hacerse para evitar contraer el VIH, si una persona puede ser VIH-positiva aunque parezca saludable, y si cree que el VIH puede ser transmitido de la madre a la hija o hijo y en qué momento.

Igualmente se les pidió a las mujeres opinar sobre los derechos de las personas con VIH-positivo para participar en el mercado laboral o llevar una vida en comunidad. También se hicieron preguntas sobre la conducta sexual en los últimos 12 meses (número y tipo de parejas sexuales y uso del condón).

11.1 CONOCIMIENTO DE VIH/SIDA Y FORMAS DE EVITAR

A las mujeres entrevistadas, se les preguntó si habían oído hablar de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana y del SIDA. A quienes respondieron afirmativamente, se indagó si había algo que una persona pueda hacer para evitar infectarse con el VIH. El conocimiento de formas programáticas y específicas de evitar el virus, la percepción de la entrevistada sobre el riesgo de infección por el VIH y los aspectos sociales de la prevención y mitigación, se presenta en los Cuadros 11.1A, 11.1B, 11.2A, 11.2B, 11.3A y 11.3B.

Conocimiento de VIH/SIDA (Cuadros 11.1A y 11.1B)

- Del total de mujeres entrevistadas, en la ENDES 2011, el 96,1 por ciento conoce o ha oído hablar del VIH/SIDA lo que implica una mejora de 8,8 puntos porcentuales, en relación con el año 2000 donde el porcentaje era de 87,3 por ciento. Este resultado corrobora que el acceso a la información ha mejorado con el tiempo y ha permitido que más mujeres estén informadas y tengan conocimiento sobre el tema.

1/ Ministerio de Salud: Dirección General de Epidemiología / Boletín Mensual Diciembre 2011.

- En el año 2011, el 6,6 por ciento de mujeres entrevistadas manifestó que desconocía alguna forma de prevención de las dos formas consideradas (menor número de parejas sexuales o uso del condón). En el año 2000, este porcentaje fue 24,7 por ciento.
- Con respecto a las mujeres que desconocen los aspectos relacionados con el VIH/SIDA, se observa que según características seleccionadas, los menores porcentajes se ubicaron en aquellas mujeres con educación secundaria (0,9 por ciento) y, en las mujeres con educación superior donde no se reportaron casos. De igual manera, en las que pertenecen al quinto y cuarto quintil de riqueza (0,2 y 0,5 por ciento, respectivamente) y residentes del área urbana (0,8 por ciento). En cambio, las mujeres entrevistadas que no tienen educación (34,6 por ciento) y, las que pertenecen al quintil inferior de riqueza (18,6 por ciento) constituyen el mayor porcentaje de mujeres que desconoce sobre el VIH/SIDA.
- Según ámbito geográfico, Huancavelica fue el departamento donde se registró el mayor porcentaje de mujeres que respondieron no conocer sobre el VIH/SIDA (17,4 por ciento), seguido por Cajamarca (16,1 por ciento) y La Libertad (9,3 por ciento); por región natural, la Sierra concentra a las mujeres que tienen menor conocimiento en este tema (9,1 por ciento); y por área de residencia, este porcentaje fue mayor en el área rural (12,6 por ciento).
- Sobre el conocimiento de las formas específicas de evitar el VIH, el 83,1 por ciento de las mujeres respondió "limitar el número de parejas sexuales o mutua fidelidad"; con relación al año 2000 se aprecia un incremento de 45,0 puntos porcentuales. Asimismo, el conocimiento sobre el uso del condón creció al pasar de 33,3 por ciento, en el año 2000 a 74,6 por ciento en el 2011.

CUADRO N° 11.1A
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA Y ESPECÍFICAS DE EVITAR EL VIH,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011
(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	No conoce VIH/SIDA	Conocimiento de dos formas de importancia programática de evitar el VIH			Conocimiento de dos formas específicas		Número de mujeres
			Ninguna de las dos formas 1/	Una forma	Dos formas	Usar condones	Limitar el número de parejas sexuales 2/	
Edad								
15-19	100,0	4,2	8,0	25,4	62,5	69,7	80,6	4 118
20-24	100,0	3,1	5,8	19,6	71,5	78,3	84,2	3 450
25-29	100,0	3,3	6,1	19,9	70,6	76,7	84,4	3 292
30-39	100,0	3,6	5,9	20,7	69,8	76,2	84,1	6 407
40-49	100,0	4,9	7,2	20,7	67,2	72,6	82,5	5 250
15-24	100,0	3,7	7,0	22,8	66,6	73,6	82,3	7 568
Estado conyugal								
Soltera	100,0	3,4	6,2	23,1	67,2	73,8	83,8	7 430
Ha tenido RS	100,0	2,4	4,6	18,8	74,3	81,0	86,4	3 036
Nunca ha tenido RS	100,0	4,2	7,4	26,1	62,3	68,8	81,9	4 394
Casada o Conviviente	100,0	4,4	7,1	20,2	68,2	74,4	82,4	12 673
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	2,8	4,9	21,2	71,1	78,0	85,3	2 415
Nivel de educación								
Sin educación	100,0	34,6	14,2	21,5	29,7	33,1	47,8	596
Primaria	100,0	11,6	12,9	23,1	52,4	60,2	67,8	4 988
Secundaria	100,0	0,9	5,9	22,1	71,1	77,6	86,7	10 421
Superior	100,0	0,0	2,2	18,5	79,2	84,5	92,4	6 512
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	100,0	18,6	14,4	23,3	43,7	50,6	60,2	3 482
Segundo quintil	100,0	3,3	9,1	21,9	65,6	72,5	80,7	4 365
Quintil intermedio	100,0	1,0	4,3	22,3	72,4	79,2	88,0	4 875
Cuarto quintil	100,0	0,5	4,4	20,5	74,5	80,6	89,0	4 892
Quintil superior	100,0	0,2	3,3	19,0	77,4	82,9	91,0	4 904
Total 2011	100,0	3,9	6,6	21,3	68,2	74,6	83,1	22 517
Total 2000	100,0	12,7	24,7	43,7	18,9	33,3	38,1	22 517

Nota: Las dos formas de importancia programática son: usar condones y limitar el número de parejas sexuales. Las respuestas provienen tanto de respuestas espontáneas como sondeos.

1/ Mujeres que no han oído hablar de VIH/SIDA o que no conocen las formas de importancia programática.

2/ Incluye ser mutuamente fiel.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO Nº 11.1B
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA Y ESPECÍFICAS DE EVITAR EL VIH,
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2011
(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	No conoce VIH/SIDA	Conocimiento de dos formas de importancia programática de evitar el VIH			Conocimiento de dos formas específicas		Número de mujeres
			Ninguna de las dos formas 1/	Una forma	Dos formas	Usar condones	Limitar el número de parejas sexuales 2/	
Área de residencia								
Urbana	100,0	0,8	4,7	20,9	73,6	79,8	88,3	16 802
Rural	100,0	12,9	12,2	22,5	52,4	59,3	68,1	5 715
Región natural								
Lima Metropolitana	100,0	0,3	4,3	21,0	74,4	80,4	89,5	6 966
Resto Costa	100,0	1,4	5,5	21,3	71,8	78,1	86,7	5 414
Sierra	100,0	9,1	9,0	21,7	60,2	66,8	75,2	7 472
Selva	100,0	3,8	8,1	20,8	67,3	73,9	81,5	2 664
Departamento								
Amazonas	100,0	5,8	10,1	23,2	61,0	68,0	77,2	288
Áncash	100,0	3,5	5,5	23,2	67,8	73,0	85,7	932
Apurímac	100,0	7,3	8,3	21,6	62,8	66,8	80,4	379
Arequipa	100,0	3,7	8,3	24,5	63,6	73,4	78,2	964
Ayacucho	100,0	8,9	11,3	30,9	48,8	57,0	71,6	658
Cajamarca	100,0	16,1	13,4	21,4	49,1	59,1	60,5	1 043
Cusco	100,0	6,1	8,6	17,4	67,8	71,9	81,1	959
Huancavelica	100,0	17,4	13,3	21,0	48,4	52,2	65,5	405
Huánuco	100,0	8,7	15,6	19,1	56,7	64,4	68,0	598
Ica	100,0	0,8	4,3	24,1	70,8	77,5	88,2	643
Junín	100,0	4,1	3,4	19,4	73,1	77,8	87,7	1 051
La Libertad	100,0	9,3	7,4	23,2	60,1	68,1	75,3	1 151
Lambayeque	100,0	1,0	5,6	21,5	71,9	78,0	87,3	1 043
Lima	100,0	0,3	4,5	21,1	74,1	80,3	89,0	7 671
Loreto	100,0	3,8	9,7	21,0	65,5	71,7	80,2	647
Madre de Dios	100,0	1,7	8,2	25,6	64,5	75,1	79,5	121
Moquegua	100,0	4,2	8,4	20,2	67,2	73,5	81,2	128
Pasco	100,0	2,1	5,0	19,8	73,1	78,3	87,8	196
Piura	100,0	4,2	4,8	16,9	74,1	78,1	87,0	1 310
Puno	100,0	6,3	7,4	21,5	64,8	71,6	79,6	986
San Martín	100,0	0,2	6,1	20,1	73,5	80,2	87,0	575
Tacna	100,0	1,1	5,3	25,0	68,7	77,3	85,2	267
Tumbes	100,0	0,7	3,5	21,5	74,4	76,4	93,8	174
Ucayali	100,0	1,7	4,9	14,9	78,6	82,9	89,2	327
Total 2011	100,0	3,9	6,6	21,3	68,2	74,6	83,1	22 517
Total 2000	100,0	12,7	24,7	43,7	18,9	33,3	38,1	27 843

Nota: Las dos formas de importancia programática son: usar condones y limitar el número de parejas sexuales. Las respuestas provienen tanto de respuestas espontáneas como sondeos.

1/ Mujeres que no han oído hablar de VIH/SIDA o que no conocen las formas de importancia programática.

2/ Incluye ser mutuamente fiel.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Gráfico 11.1
CONOCIMIENTO DE FORMAS ESPECÍFICAS DE EVITAR EL VIH, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA





GRÁFICO Nº 11.2
PERÚ: MUJERES CON CONOCIMIENTO DE DOS FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA DE EVITAR EL VIH, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA, 2000 Y 2011 (Porcentaje)



11.2 CONOCIMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL VIH

A las mujeres entrevistadas se les hizo una serie de preguntas sobre asuntos relacionados con el VIH con el propósito de evaluar el grado de conocimiento sobre el tema. Específicamente si una persona que parece saludable puede ser VIH-positiva y si puede ser transmitido de la madre a la hija o hijo y en qué momento. Los resultados obtenidos se presentan en los Cuadros 11.2A y 11.2B.

Asuntos relacionados con el VIH (Cuadros 11.2A y 11.2B)

- El 75,7 por ciento de mujeres entrevistadas en la ENDES 2011 manifestó que una persona que parece saludable pueda tener el VIH, incrementándose en 5,4 puntos porcentuales con respecto al año 2000 (70,3 por ciento). Se advierte que el porcentaje de mujeres que consideraron una posición contraria ha aumentado 5,0 puntos porcentuales, lo que significaría un retroceso en el nivel de conocimiento y percepción que tienen las mujeres sobre el tema. Por otro lado, se constata una mejora entre las mujeres que respondieron "No sabe o no tiene información", al registrar un porcentaje menor en el año 2011 (9,9 por ciento) respecto al año 2000 (20,3 por ciento). En efecto, en términos comparativos disminuyó en 10,4 puntos porcentuales.
- Las mujeres que respondieron en mayor porcentaje acerca de que una persona que parece saludable pueda tener el VIH, fueron las que alcanzaron educación superior (92,3 por ciento), del quinto y cuarto quintil de riqueza (90,4 y 86,2 por ciento, respectivamente) y, solteras que han tenido relaciones sexuales (82,0 por ciento). Por área de residencia, fue mayor en la urbana (83,3 por ciento), por ámbito geográfico en Lima Metropolitana (86,1 por ciento) y Resto Costa (79,6 por ciento), mientras que por departamento fueron Tumbes (86,2 por ciento), Lima (85,6 por ciento), Arequipa (83,3 por ciento) y Pasco (82,7 por ciento).
- Dado que el VIH registra un largo periodo asintomático, el desconocer que una persona aparentemente saludable pueda transmitir este virus permitiría que muchas mujeres incurran en contactos sexuales de riesgo.
- También es muy preocupante los datos obtenidos respecto a la transmisión vertical (madre a hija o hijo) del VIH. Al respecto, se constató un importante incremento en el porcentaje de mujeres que refirieron que el virus no se puede transmitir en esta condición. El 20,9 por ciento de mujeres no consideraron esta posibilidad, significando una disminución de 5,4 puntos porcentuales respecto a la ENDES 2000 que fue 26,3 por ciento. A pesar de esta disminución, todavía se pone en inminente riesgo a la hija e hijo por nacer en el caso que su madre fuera portadora del VIH.
- Por otra parte, entre las mujeres que identifican las formas de transmisión del VIH de madre a hija o hijo, un 64,2 por ciento mencionó que puede ocurrir durante el embarazo o parto y un 37,9 por ciento con la lactancia, habiendo disminuido el grupo que no sabe el mecanismo de transmisión (de 12,7 por ciento en la ENDES 2000 a 3,9 por ciento en la ENDES 2011).
- Investigaciones especializadas, sobre el tema, enfatizan sobre la importancia del control prenatal en esta etapa, ya que la identificación de una gestante con VIH permitiría que reciba el tratamiento profiláctico correspondiente (antirretrovirales, cesárea electiva y lactancia artificial) para disminuir el riesgo en la hija o hijo.

CUADRO Nº 11.2A

PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL VIH Y TRANSMISIÓN DEL VIH DE LA MADRE A LA HIJA O HIJO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011

(Porcentaje)

Característica seleccionada	Una persona que parece saludable puede tener el VIH			El VIH se puede transmitir de la madre a la hija o hijo				Número de mujeres
	Si	No	No sabe / No conoce	No 1/	Durante el embarazo o parto	Durante la lactancia	No sabe 2/	
Edad								
15-19	74,9	16,6	8,5	20,0	61,0	43,9	4,2	4 118
20-24	78,7	13,5	7,7	17,3	67,1	43,0	3,1	3 450
25-29	77,5	13,4	9,2	20,1	65,6	41,6	3,3	3 292
30-39	76,4	13,6	10,0	21,1	65,8	34,6	3,6	6 407
40-49	72,6	14,9	12,5	24,3	61,9	31,6	4,9	5 250
15-24	76,6	15,2	8,2	18,8	63,8	43,5	3,7	7 568
Estado conyugal								
Soltera	78,5	13,8	7,7	16,9	68,6	40,9	3,4	7 430
Ha tenido RS	82,0	11,5	6,5	14,6	73,9	38,3	2,4	3 036
No ha tenido RS	76,1	15,4	8,5	18,5	64,9	42,8	4,2	4 394
Casada o Conviviente	73,4	15,4	11,2	23,8	60,8	36,6	4,4	12 673
Divorciada/Separada/Viuda	79,8	10,9	9,3	18,5	68,1	35,5	2,8	2 415
Nivel de educación								
Sin educación	30,9	21,2	47,9	68,9	17,1	18,6	34,6	596
Primaria	54,2	22,2	23,6	44,5	36,8	29,8	11,6	4 988
Secundaria	78,3	15,6	6,1	15,4	67,1	41,0	0,9	10 421
Superior	92,3	5,9	1,8	7,3	84,8	40,9	0,0	6 512
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	45,3	24,7	30,0	50,9	30,2	29,3	18,6	3 482
Segundo quintil	67,4	21,2	11,5	27,5	52,7	39,6	3,3	4 365
Quintil intermedio	79,8	13,4	6,8	15,7	68,6	40,4	1,0	4 875
Cuarto quintil	86,2	9,5	4,4	12,0	74,9	39,5	0,5	4 892
Quintil superior	90,4	6,9	2,7	7,9	83,3	38,4	0,2	4 904
Total 2011	75,7	14,4	9,9	20,9	64,2	37,9	3,9	22 517
Total 2000	70,3	9,4	20,3	26,3	60,4	29,3	12,7	27 843

1/ Incluye las que respondieron no y no sabe acerca de la transmisión del VIH de la madre a la hija o hijo.
 2/ No ha oído hablar de VIH/sida.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO Nº 11.2B

PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL VIH Y TRANSMISIÓN DEL VIH DE LA MADRE A LA HIJA O HIJO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2011

(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Una persona que parece saludable puede tener el VIH			El VIH se puede transmitir de la madre a la hija o hijo			Número de mujeres	
	Si	No	No sabe / No conoce	No 1/	Durante el embarazo o parto	Durante la lactancia		No sabe 2/
Área de residencia								
Urbana	83,3	11,2	5,5	14,0	72,8	39,4	0,8	16 802
Rural	53,5	23,8	22,7	41,3	38,8	33,5	12,9	5 715
Región natural								
Lima Metropolitana	86,1	10,1	3,8	10,0	78,0	39,0	0,3	6 966
Resto Costa	79,6	12,2	8,2	17,3	69,0	39,8	1,4	5 414
Sierra	65,0	18,3	16,6	32,8	49,3	35,2	9,1	7 472
Selva	70,8	19,0	10,2	23,6	59,9	38,7	3,8	2 664
Departamento								
Amazonas	64,6	22,6	12,7	26,2	58,3	41,7	5,8	288
Áncash	72,1	16,4	11,5	19,7	65,2	36,1	3,5	932
Apurímac	51,3	36,7	12,1	31,8	46,4	43,5	7,3	379
Arequipa	83,3	9,2	7,5	18,2	68,0	25,4	3,7	964
Ayacucho	57,8	17,9	24,3	37,1	40,6	39,7	8,9	658
Cajamarca	51,9	23,3	24,8	40,4	48,1	32,7	16,1	1 043
Cusco	69,8	16,2	14,1	32,8	47,1	40,7	6,1	959
Huancavelica	49,0	17,2	33,8	46,4	32,0	34,1	17,4	405
Huánuco	57,1	26,5	16,4	34,6	49,8	32,2	8,7	598
Ica	79,6	10,2	10,2	16,2	68,0	41,5	0,8	643
Junín	78,4	13,1	8,4	22,3	62,3	38,8	4,1	1 051
La Libertad	72,0	8,1	19,9	34,6	55,0	28,9	9,3	1 151
Lambayeque	74,9	18,1	7,1	14,9	72,7	34,8	1,0	1 043
Lima	85,6	10,4	4,0	10,3	77,3	39,5	0,3	7 671
Loreto	72,8	18,6	8,6	26,9	56,8	37,0	3,8	647
Madre de Dios	74,3	18,9	6,8	22,7	65,1	33,7	1,7	121
Moquegua	75,8	13,4	10,8	18,9	70,2	34,7	4,2	128
Pasco	82,7	13,0	4,4	15,3	66,8	44,3	2,1	196
Piura	76,6	13,0	10,4	20,2	64,9	43,9	4,2	1 310
Puno	66,9	22,1	11,0	36,1	39,3	37,6	6,3	986
San Martín	79,2	16,0	4,7	13,2	65,2	47,1	0,2	575
Tacna	81,0	12,8	6,1	18,9	67,6	39,7	1,1	267
Tumbes	86,2	9,9	3,9	12,4	67,7	54,7	0,7	174
Ucayali	75,9	16,1	8,0	23,9	62,5	35,0	1,7	327
Total 2011	75,7	14,4	9,9	20,9	64,2	37,9	3,9	22 517
Total 2000	70,3	9,4	20,3	26,3	60,4	29,3	12,7	27 843

1/ Incluye las que respondieron no y no sabe acerca de la transmisión del VIH de la madre a la hija o hijo.

2/ No ha oído hablar de VIH / sida.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Aspectos sociales de la prevención del VIH (Cuadros 11.3A y 11.3B)

- Del total de mujeres entrevistadas que conoce del VIH/SIDA, más de la mitad (56,9 por ciento) opinó que una maestra o maestro con VIH si puede seguir enseñando (incremento de 8,9 puntos porcentuales respecto a la ENDES 2000), representando un avance en este aspecto; aunque no se debe pasar por alto que también hay más mujeres que piensan lo contrario, es decir, que no debe enseñar, y que representan un 36,3 por ciento (0,4 punto porcentual más que en la ENDES 2000).
- Las opiniones sobre si la persona VIH-positiva podría ser despedida de su trabajo fueron, en comparación con la ENDES 2000, las siguientes: 23,1 por ciento opinó que si puede ser despedida(o) (disminuyó en 8,4 puntos porcentuales), y 69,7 por ciento manifestó lo contrario (se incrementó en 18,6 puntos porcentuales).
- Han aumentado los porcentajes en las respuestas sobre si las mujeres entrevistadas estarían dispuestas a cuidar en el hogar a un pariente con el VIH: sí lo harían, un 72,2 por ciento (58,3 por ciento en la ENDES 2000), y no lo harían, un 20,1 por ciento (19,9 por ciento en la ENDES 2000).
- La respuesta "No sabe" a cada una de las tres preguntas mencionadas también debe llamar la atención por su relevancia en las acciones que se debe tomar para el futuro. El 6,8 por ciento de mujeres no sabía si a una maestra (o) con VIH se le debe permitir o continuar impartiendo clases en la escuela, colegio o universidad; 7,2 por ciento no sabía si una persona VIH-positiva podría ser despedida de su trabajo; y un 7,7 por ciento no sabía si cuidaría en el hogar a un pariente que vive con el VIH.
- Se observa que la mayoría de mujeres que opinaron que a una maestra (o) con VIH no se le debe permitir o continuar impartiendo clases en la escuela, colegio o universidad residían en el área rural (59,6 por ciento), con educación primaria o sin educación (59,5 y 49,2 por ciento, respectivamente) y ubicadas en el primer y segundo quintil de riqueza (58,8 y 54,6 por ciento, respectivamente). Este comportamiento también se observó en las mujeres que manifestaron que una persona VIH-positiva podría ser despedida de su trabajo.
- El mayor porcentaje de mujeres opinó que una persona que vive con el VIH no puede ser despedida del trabajo, especialmente entre las mujeres con educación superior y secundaria (89,0 y 73,7 por ciento, respectivamente), del quintil superior y cuarto quintil de riqueza (87,5 y 83,7 por ciento, respectivamente), de Lima Metropolitana (83,1 por ciento) y del área urbana (79,2 por ciento). Asimismo, entre aquellas que manifestaron estarían dispuestas a cuidar a un pariente VIH-positiva en el hogar.

CUADRO N° 11.3A

PERÚ: MUJERES POR RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE CIERTOS ASPECTOS SOCIALES DE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL VIRUS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011
(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Maestra/Maestro con VIH debe seguir enseñando			Persona VIH-positiva puede ser despedida del trabajo			Dispuesta a cuidar pariente con VIH en el hogar			Número de mujeres
	Si	No	No sabe	Si	No	No sabe	Si	No	No sabe	
Edad										
15-19	52,3	41,4	6,3	23,4	69,6	7,1	74,4	18,8	6,9	4 118
20-24	62,1	31,9	6,0	18,3	76,0	5,6	74,9	18,7	6,4	3 450
25-29	57,9	35,3	6,8	22,3	70,3	7,4	69,6	22,4	8,1	3 292
30-39	57,7	35,3	7,0	23,2	69,8	7,1	71,4	21,1	7,5	6 407
40-49	55,3	37,0	7,7	26,3	65,4	8,3	71,4	19,4	9,2	5 250
15-24	56,8	37,0	6,2	21,1	72,5	6,4	74,6	18,7	6,6	7 568
Estado conyugal										
Soltera	62,6	31,7	5,6	18,9	75,1	6,0	78,5	15,1	6,3	7 430
Ha tenido RS	68,6	26,6	4,8	16,7	78,9	4,4	80,4	14,0	5,6	3 036
Nunca ha tenido RS	58,5	35,3	6,2	20,4	72,5	7,1	77,2	15,9	6,8	4 394
Casada o Conviviente	52,6	39,7	7,7	26,0	65,7	8,2	68,1	23,2	8,6	12 673
Divorciada/Separada/Viuda	61,5	32,5	6,0	20,3	74,2	5,5	74,2	18,7	7,1	2 415
Nivel de educación										
Sin educación	11,9	49,2	38,9	32,4	24,0	43,6	37,2	23,7	39,1	596
Primaria	24,8	59,5	15,7	41,1	41,7	17,2	57,2	27,7	15,1	4 988
Secundaria	58,7	37,6	3,7	22,4	73,7	3,9	75,6	19,8	4,5	10 421
Superior	82,7	15,1	2,2	9,5	89,0	1,5	81,4	14,3	4,3	6 512
Quintil de riqueza										
Quintil inferior	18,6	58,8	22,6	39,2	35,3	25,5	48,6	30,0	21,5	3 482
Segundo quintil	38,9	54,6	6,4	35,5	56,6	7,9	68,0	25,1	7,0	4 365
Quintil intermedio	59,5	35,8	4,7	22,0	74,3	3,8	77,5	17,6	4,9	4 875
Cuarto quintil	73,0	23,8	3,2	13,9	83,7	2,5	80,4	14,9	4,7	4 892
Quintil superior	81,3	16,9	1,7	10,9	87,5	1,7	79,3	16,3	4,3	4 904
Total 2011	56,9	36,3	6,8	23,1	69,7	7,2	72,2	20,1	7,7	22 517
Total 2000	48,0	35,9	16,1	31,5	51,1	17,4	58,3	19,9	21,8	27 843

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO Nº 11.3B

PERÚ: MUJERES POR RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE CIERTOS ASPECTOS SOCIALES DE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL VIRUS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2011
(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Maestra/Maestro con VIH debe seguir enseñando			Persona VIH-positiva puede ser despedida del trabajo			Dispuesta a cuidar pariente con VIH en el hogar			Número de mujeres
	Si	No	No sabe	Si	No	No sabe	Si	No	No sabe	
Área de residencia										
Urbana	68,0	28,4	3,6	17,6	79,2	3,2	77,8	17,2	5,0	16 802
Rural	24,2	59,6	16,3	39,3	41,9	18,8	55,7	28,6	15,7	5 715
Región natural										
Lima Metropolitana	75,5	22,0	2,5	14,5	83,1	2,4	79,1	17,2	3,8	6 966
Resto Costa	61,6	33,4	5,0	17,8	78,0	4,2	75,0	18,3	6,7	5 414
Sierra	39,9	47,9	12,2	33,0	53,2	13,8	64,0	23,8	12,2	7 472
Selva	46,3	46,8	6,8	28,5	64,2	7,3	71,6	20,9	7,5	2 664
Departamento										
Amazonas	40,0	50,9	9,2	29,3	58,7	12,0	69,3	23,0	7,7	288
Áncash	50,3	42,8	6,9	32,5	59,8	7,8	72,8	21,0	6,2	932
Apurímac	31,0	60,6	8,4	49,5	40,7	9,7	61,9	30,2	7,9	379
Arequipa	67,9	25,8	6,3	17,2	77,6	5,2	71,7	20,3	8,0	964
Ayacucho	33,6	51,5	14,9	34,7	46,9	18,5	62,8	22,0	15,2	658
Cajamarca	33,8	48,5	17,7	30,5	50,3	19,2	57,7	23,0	19,3	1 043
Cusco	39,2	51,0	9,8	37,2	53,8	9,0	62,7	27,6	9,7	959
Huancavelica	25,5	51,4	23,0	23,0	47,1	29,9	49,2	30,4	20,4	405
Huánuco	38,9	48,5	12,7	35,1	52,8	12,2	62,5	26,6	10,9	598
Ica	64,4	30,9	4,8	13,0	84,1	2,9	77,9	16,6	5,6	643
Junín	51,9	40,9	7,2	31,6	61,2	7,2	81,4	11,1	7,5	1 051
La Libertad	55,1	30,4	14,5	17,5	69,4	13,1	65,5	17,8	16,7	1 151
Lambayeque	55,6	41,5	3,0	22,0	74,8	3,2	73,8	19,6	6,7	1 043
Lima	73,7	23,7	2,7	15,0	82,4	2,6	78,7	17,5	3,8	7 671
Loreto	44,4	48,1	7,5	26,0	66,9	7,1	67,1	25,8	7,2	647
Madre de Dios	48,3	46,9	4,8	28,2	67,6	4,2	77,2	19,1	3,8	121
Moquegua	62,5	28,2	9,4	17,7	73,5	8,7	69,9	14,6	15,5	128
Pasco	53,6	42,8	3,6	31,0	65,8	3,2	77,8	18,8	3,5	196
Piura	54,8	37,8	7,5	22,3	70,2	7,6	70,7	21,0	8,3	1 310
Puno	33,5	57,6	8,9	37,5	48,7	13,8	62,5	28,3	9,2	986
San Martín	45,6	52,1	2,2	28,7	69,5	1,9	76,7	19,9	3,5	575
Tacna	65,4	30,6	4,0	13,3	82,6	4,0	75,0	19,0	6,0	267
Tumbes	64,2	33,3	2,5	22,3	75,7	2,0	73,1	22,7	4,2	174
Ucayali	65,8	29,6	4,6	20,3	74,4	5,3	82,0	13,8	4,2	327
Total 2011	56,9	36,3	6,8	23,1	69,7	7,2	72,2	20,1	7,7	22 517
Total 2000	48,0	35,9	16,1	31,5	51,1	17,4	58,3	19,9	21,8	27 843

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).


11.3 CONOCIMIENTO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Los programas de control de VIH reconocen, en la actualidad, la importancia de controlar las ITS para reducir la transmisión del virus. Se reconoce que entre los esfuerzos necesarios, uno de los más importantes es la educación para que la población reconozca los síntomas de las ITS. Asimismo, poco se sabe sobre cómo las personas perciben y responden a las ITS. Por esta razón en la ENDES 2011, se preguntó a las entrevistadas si habían oído hablar de otras enfermedades que se pueden transmitir a través de las relaciones sexuales; cuáles son las enfermedades que conocía; y que síntomas y signos pueden hacer parecer que una mujer o un hombre tenía una infección de transmisión sexual. Los resultados se pueden apreciar en los Cuadros 11.4A, 11.4B, 11.5A y 11.5B.

Conocimiento de las ITS (Cuadros 11.4A y 11.4B)


- El conocimiento sobre las ITS se ha incrementado en 12,9 puntos porcentuales entre la ENDES 2000 y la ENDES 2011, pero si consideramos que el 37,7 por ciento de las mujeres entrevistadas declaró desconocer lo que éstas significan. Que más de la tercera parte de la población entrevistada no conozca de las ITS implica un riesgo potencial de adquirirlas, y esto incluye la posibilidad de padecer secuelas y complicaciones importantes de no atenderlas a tiempo.
- El mayor desconocimiento de las ITS se presentó entre las mujeres sin educación (82,2 por ciento) y en las mujeres que pertenecen al primer quintil de riqueza (74,9 por ciento).
- Asimismo, destaca el alto porcentaje en mujeres con educación primaria (72,4 por ciento), y segundo quintil de riqueza (56,0 por ciento). Por ámbito geográfico del área rural (68,6 por ciento) y de la Sierra (55,0 por ciento), por su desconocimiento sobre las ITS.

GRÁFICO N° 11.3
PERÚ: CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011
(Porcentaje)



Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

GRÁFICO N° 11.4
PERÚ: PORCENTAJE DE MUJERES POR DESCONOCIMIENTO SOBRE
LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL,
SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA, 200 Y 2011
(Porcentaje)



Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

- Los departamentos donde las mujeres entrevistadas registraron mayor desconocimiento de las ITS fueron: Huancavelica (79,7 por ciento), Cajamarca (72,8 por ciento) y Puno (71,3 por ciento).
- Un 21,5 por ciento de las mujeres entrevistadas no conocía síntomas de las ITS (12,5 puntos porcentuales más que en el 2000), 15,4 por ciento conocía un síntoma y 25,3 por ciento dos o más síntomas. Estos porcentajes resultan bajos, en tanto significa que una gran mayoría de personas con una ITS no sabría identificarla con el consiguiente riesgo de transmitir a otras personas, no recibir un tratamiento oportuno y padecer secuelas o complicaciones a futuro.
- En comparación con encuestas anteriores, hay menos mujeres que conocen ITS específicas entre quienes conocen síntomas: de 63,8 por ciento que conocían la sífilis y 58,9 por ciento la gonorrea en la ENDES 2000, bajó a 44,9 y 40,7 por ciento, respectivamente en la ENDES 2011. Asimismo hubo una ligera disminución en el porcentaje de mujeres que conocen verrugas genitales/condiloma ya que de 4,4 por ciento en el año 2000 pasó a 4,1 por ciento en el año 2011.
- Las ITS específicas más conocidas fueron la sífilis (44,9 por ciento), gonorrea (40,7 por ciento) y el chancro (21,4 por ciento).
- La sífilis fue la enfermedad más reconocida en las mujeres con educación superior (62,4 por ciento) y el quinto quintil de riqueza (58,1 por ciento). Por área de residencia fue mayor en la urbana (48,1 por ciento), por región en Lima Metropolitana (50,2 por ciento) y, por departamento en La Libertad (58,9 por ciento).
- La gonorrea fue más conocida en mujeres con educación superior de riqueza (54,6 por ciento), de 20 a 24 años de edad (50,3 por ciento) y, ubicadas en el quinto quintil de riqueza (49,5 por ciento). Por área de residencia fue mayor en la urbana (42,9 por ciento), por región en la Selva (57,1 por ciento) y, por departamento en Loreto (67,0 por ciento).
- El chancro, fue más conocido en mujeres con educación superior (28,4 por ciento) y, en solteras que tuvieron relaciones sexuales (27,2 por ciento). Por área de residencia fue mayor en la urbana (21,7 por ciento), por región natural en la Selva (29,1 por ciento) y, por departamento en Ayacucho (49,1 por ciento).

CUADRO Nº 11.4A

PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)
Y MUJERES QUE CONOCEN ITS ESPECÍFICAS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011

(Porcentaje)

Característica seleccionada	Total	No conoce sobre las ITS	Síntomas específicos de las ITS			Número de mujeres	Conoce ITS específicas					Número de mujeres que conocen síntomas	
			No conoce síntomas de ITS	Conoce un síntoma	Conoce dos o más síntomas		Sífilis	Gonorrrea	Verrugas genitales/ Condiloma	Chancro	Herpes		Otras ITS 1/
Edad													
15-19	100,0	45,9	24,2	15,0	14,9	4 118	34,2	37,2	4,2	14,1	12,1	7,8	2 228
20-24	100,0	32,7	21,2	16,7	29,5	3 450	52,0	50,3	4,9	26,9	13,8	9,5	2 323
25-29	100,0	33,8	21,5	16,3	28,4	3 292	54,4	48,0	5,4	26,3	11,6	10,7	2 180
30-39	100,0	35,7	20,7	14,7	28,9	6 407	45,7	38,1	3,8	20,6	6,6	11,5	4 117
40-49	100,0	39,6	20,6	15,3	24,6	5 250	39,9	34,6	3,1	20,4	6,1	9,2	3 172
15-24	100,0	39,9	22,8	15,8	21,5	7 568	43,3	43,9	4,6	20,6	13,0	8,7	4 551
Estado conyugal													
Soltera	100,0	33,7	23,0	17,1	26,1	7 430	47,4	46,7	5,1	22,3	14,6	10,4	4 925
Ha tenido RS	100,0	23,1	21,5	18,0	37,4	3 036	53,5	49,4	6,4	27,2	14,0	12,0	2 333
Nunca ha tenido RS	100,0	41,0	24,1	16,5	18,3	4 394	42,0	44,4	4,0	17,9	15,1	9,0	2 592
Casada o Conviviente	100,0	41,6	20,7	13,9	23,8	12 673	43,1	37,1	3,4	20,5	6,1	9,5	7 404
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	30,0	21,0	18,0	31,0	2 415	45,7	39,2	4,6	23,1	8,1	10,7	1 690
Nivel de educación													
Sin educación	100,0	82,2	11,3	3,7	2,8	596	2,1	7,8	0,0	7,5	3,0	1,8	106
Primaria	100,0	72,4	15,4	6,0	6,1	4 988	11,3	18,6	2,4	14,1	1,6	7,2	1 375
Secundaria	100,0	36,8	25,6	17,1	20,5	10 421	36,8	33,4	3,4	16,9	6,8	8,7	6 582
Superior	100,0	8,6	20,6	21,0	49,9	6 512	62,4	54,6	5,4	28,4	14,0	12,1	5 955
Quintil de riqueza													
Quintil inferior	100,0	74,9	14,8	5,4	4,9	3 482	14,5	24,9	1,3	16,4	1,4	4,0	875
Segundo quintil	100,0	56,0	19,9	11,1	13,0	4 365	30,4	32,8	3,8	23,1	4,4	7,6	1 922
Quintil intermedio	100,0	36,4	24,0	15,4	24,3	4 875	42,4	38,0	3,3	21,6	7,1	8,9	3 101
Cuarto quintil	100,0	22,2	24,8	20,5	32,5	4 892	46,5	40,7	4,1	22,7	10,1	10,7	3 807
Quintil superior	100,0	12,1	21,8	21,5	44,7	4 904	58,1	49,5	5,6	20,5	14,0	12,2	4 312
Total 2011	100,0	37,7	21,5	15,4	25,3	22 517	44,9	40,7	4,1	21,4	9,3	9,9	14 019
Total 2000	100,0	50,6	9,0	11,8	28,6	27 843	63,8	58,9	4,4	n.d.	n.d.	21,2	13 766

1/ A partir del año 2010, se excluye Herpes.

nd= No disponible.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO N° 11.4B
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
(ITS) Y MUJERES QUE CONOCEN ITS ESPECÍFICAS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2011
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Total	No conoce sobre las ITS	Síntomas específicos de las ITS			Número de mujeres	Conoce ITS específicas					Número de mujeres que conocen síntomas	
			No conoce síntomas de ITS	Conoce un síntoma	Conoce dos o más síntomas		Sifilis	Gonorrea	Verrugas genitales/ Condiloma	Chancro	Herpes		Otras ITS 1/
Área de residencia													
Urbana	100,0	27,2	23,4	18,1	31,2	16 802	48,1	42,9	4,4	21,7	10,3	10,6	12 226
Rural	100,0	68,6	15,9	7,4	8,1	5 715	23,4	26,2	2,3	19,4	2,8	5,5	1 792
Región natural													
Lima Metropolitana	100,0	19,4	23,5	21,1	36,0	6 966	50,2	39,8	4,7	19,1	12,0	13,1	5 612
Resto Costa	100,0	37,8	20,4	16,1	25,7	5 414	48,3	43,2	4,0	17,9	8,4	9,0	3 370
Sierra	100,0	55,0	20,1	10,0	14,9	7 472	36,4	31,7	3,3	25,0	7,9	6,1	3 361
Selva	100,0	37,1	22,2	14,4	26,2	2 664	37,6	57,1	4,2	29,1	5,0	9,0	1 675
Departamento													
Amazonas	100,0	47,8	19,7	12,6	19,8	288	41,6	42,8	5,1	35,6	5,1	2,2	150
Áncash	100,0	26,0	31,3	19,5	23,3	932	27,1	24,9	5,1	10,8	7,1	1,9	690
Apurímac	100,0	67,9	16,6	7,2	8,2	379	33,1	20,7	1,3	26,2	6,6	13,9	122
Arequipa	100,0	27,5	31,7	18,7	22,1	964	42,2	38,5	2,8	16,3	10,8	4,6	699
Ayacucho	100,0	62,2	16,3	8,2	13,3	658	41,9	36,5	3,7	49,1	7,9	9,1	248
Cajamarca	100,0	72,8	11,6	5,4	10,2	1 043	46,8	49,9	2,3	28,5	9,6	6,0	284
Cusco	100,0	49,6	22,8	10,4	17,2	959	34,5	28,4	2,3	25,0	9,4	8,0	484
Huancavelica	100,0	79,7	8,5	4,9	6,8	405	38,0	35,6	4,3	40,6	7,0	3,0	82
Huánuco	100,0	52,8	20,5	7,1	19,6	598	37,8	38,4	5,2	30,0	6,8	11,7	282
Ica	100,0	27,4	24,0	15,7	32,8	643	43,7	38,7	4,6	17,9	8,3	12,0	467
Junín	100,0	34,0	26,8	14,5	24,7	1 051	41,9	33,0	6,5	35,3	8,1	4,6	694
La Libertad	100,0	62,1	15,2	7,9	14,8	1 151	58,9	52,6	4,1	16,5	10,6	9,2	436
Lambayeque	100,0	43,1	16,7	20,4	19,7	1 043	57,8	50,8	2,7	17,1	7,0	6,4	593
Lima	100,0	20,5	23,7	20,7	35,1	7 671	49,2	39,0	4,5	19,1	11,4	12,8	6 098
Loreto	100,0	38,3	26,9	12,3	22,4	647	35,8	67,0	7,6	24,9	3,3	10,3	399
Madre de Dios	100,0	39,3	28,7	12,8	19,2	121	42,8	42,3	4,1	28,5	6,9	2,4	74
Moquegua	100,0	20,6	30,3	17,9	31,2	128	44,7	38,4	1,6	21,3	8,0	11,6	101
Pasco	100,0	53,7	9,3	12,4	24,5	196	45,7	42,7	4,0	28,4	7,5	10,3	90
Piura	100,0	45,1	17,9	13,2	23,7	1 310	50,7	47,9	4,1	18,7	7,5	10,8	719
Puno	100,0	71,3	14,8	5,5	8,4	986	23,3	25,3	0,4	17,8	3,0	4,7	283
San Martín	100,0	20,6	19,0	17,9	42,5	575	33,2	61,0	2,6	28,9	6,1	9,4	457
Tacna	100,0	33,1	18,1	20,7	28,2	267	39,4	36,6	4,5	19,1	14,4	17,1	179
Tumbes	100,0	26,6	14,7	20,0	38,8	174	39,4	38,1	4,5	22,4	6,3	2,4	128
Ucayali	100,0	20,6	26,4	20,4	32,5	327	42,8	66,1	1,3	29,0	4,7	13,8	260
Total 2011	100,0	37,7	21,5	15,4	25,3	22 517	44,9	40,7	4,1	21,4	9,3	9,9	14 019
Total 2000	100,0	50,6	9,0	11,8	28,6	27 843	63,8	58,9	4,4	n.d	n.d	21,2	13 766

1/ A partir del año 2010, se excluye Herpes.
nd= no disponible

Síntomas y signos de las ITS (Cuadros 11.5A y 11.5B)

- En cuanto a los síntomas y signos específicos que las mujeres entrevistadas con conocimiento de ITS manifestaron, la mayoría refirió que fue el enrojecimiento/picazón en genitales (30,6 por ciento), seguido de úlceras/lagas genitales (22,4 por ciento), inflamación o hinchazón en genitales (21,6 por ciento) y secreción por genital (17,3 por ciento).
- En relación con el enrojecimiento/picazón en genitales, el mayor porcentaje por característica seleccionada fue entre las mujeres con educación superior (40,6 por ciento), ubicadas en el quinto quintil de riqueza (38,6 por ciento) y solteras que han tenido relaciones sexuales (36,2 por ciento). Por ámbito geográfico, las residentes en el área urbana (32,1 por ciento) y en Lima Metropolitana (34,2 por ciento).
- Las úlceras/lagas genitales fueron referidas en mayor porcentaje por característica seleccionada entre las mujeres con educación superior (30,9 por ciento), solteras que han tenido relaciones sexuales (30,3 por ciento) y ubicadas en el quinto quintil de riqueza (29,6 por ciento). Por ámbito geográfico, las residentes en Lima Metropolitana (28,0 por ciento) y en el área urbana (24,1 por ciento).
- La secreción por genitales por característica seleccionada, fue manifestada más por mujeres con educación superior (24,2 por ciento), ubicadas en el quinto quintil de riqueza (20,6 por ciento), entre 30 y 39 años de edad (20,5 por ciento) y divorciadas/separadas/viudas (20,2 por ciento). Por ámbito geográfico, las residentes en la Selva (21,6 por ciento) y, en el área urbana (18,1 por ciento).
- Aunque no se especifica cuáles son, un importante 19,5 por ciento de las mujeres con conocimiento de las ITS refirió que identifican «otros síntomas».
- Las mujeres entrevistadas que en mayor porcentaje identificaron el enrojecimiento/picazón en genitales, residían en los departamentos de Tumbes (43,7 por ciento) y San Martín (39,2 por ciento), las úlceras/lagas genitales en Tumbes (29,4 por ciento) y la secreción por genitales en Ucayali (31,2 por ciento) y Tumbes (28,3 por ciento).
- Llama la atención que un síntoma evidente como es la secreción o pus por el pene solo fue reconocido en un 4,6 por ciento para el año 2011, cuando en el 2000 fue de 8,5 por ciento. Las verrugas genitales se identificó como probable ITS por solo el 6,7 por ciento de mujeres entrevistadas.
- En general se observa que el desconocimiento de las ITS, algunas de ellas específicas, y de sus signos y síntomas fue mayor en la población rural, en la Sierra, en las mujeres con menor nivel educativo y, en situación de pobreza, aspectos que deben ser enfrentados y revertidos, básicamente, para evitar la influencia de las ITS como factor de riesgo para adquirir el VIH o de sufrir secuelas y complicaciones (infertilidad, cáncer genital, abortos, embarazos ectópicos, etc.) que afectan la calidad de vida de las mujeres.

CUADRO Nº 11.5A
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Síntomas y signos de las infecciones de transmisión sexual (ITS)														Número de mujeres
	Dolor abdominal	Secreción por genital 1/	Secreción vaginal	Molestia al orinar	Enrojecimiento/Picazón en genitales	Inflamación o hinchazón en genitales	Úlceras/Llagas genitales	Verrugas genitales	Sangre en la orina	Pérdida de peso	Puede no haber síntomas	Impotencia/Infertilidad	Secreción o pus por el pene	Otros síntomas	
Grupo de edad															
15-19	3,8	10,2	8,7	7,5	19,0	14,3	17,8	5,0	1,2	15,0	1,2	0,5	3,3	21,9	2 228
20-24	5,4	16,2	15,5	12,9	31,7	23,1	28,6	8,7	2,1	14,8	0,9	0,5	4,6	21,4	2 323
25-29	4,7	18,8	16,3	12,2	34,6	22,3	24,2	7,5	2,0	14,7	1,8	0,7	4,2	18,1	2 180
30-39	4,3	20,5	16,8	10,1	33,5	22,9	22,6	6,6	1,2	12,4	1,6	0,3	4,8	17,3	4 117
40-49	4,9	17,7	14,9	9,1	31,3	23,4	19,7	6,0	1,5	13,7	1,9	0,4	5,5	20,4	3 172
15-24	4,6	13,3	12,2	10,3	25,5	18,8	23,3	6,9	1,7	14,9	1,1	0,5	3,9	21,6	4 551
Estado conyugal															
Soltera	4,5	14,5	13,6	10,6	28,5	21,3	25,3	7,5	1,6	15,8	1,4	0,6	3,6	21,6	4 925
Ha tenido RS	5,1	20,0	17,9	12,7	36,2	26,6	30,3	10,4	1,7	14,2	1,4	0,7	4,6	19,1	2 333
Nunca ha tenido RS	4,0	9,6	9,8	8,7	21,6	16,5	20,8	4,9	1,5	17,3	1,5	0,4	2,7	23,8	2 592
Casada o Conviviente	4,6	18,4	15,4	9,9	30,7	21,5	20,5	6,1	1,6	12,6	1,6	0,4	5,1	18,5	7 404
Divorciada/Separada/Viuda	4,7	20,2	15,5	11,0	35,9	23,2	22,3	7,1	1,4	13,7	1,2	0,2	5,3	18,3	1 690
Nivel de educación															
Sin educación	4,3	2,7	3,6	5,7	11,8	11,5	1,3	0,4	0,0	15,2	0,0	0,0	1,4	11,3	106
Primaria	4,1	9,8	6,7	7,2	17,5	14,3	8,4	2,2	0,5	10,9	0,8	0,2	4,8	15,0	1 375
Secundaria	3,7	12,8	10,7	8,1	24,5	17,6	18,0	4,8	1,3	13,7	1,4	0,3	3,6	18,9	6 582
Superior	5,7	24,2	21,4	13,5	40,6	28,0	30,9	9,9	2,2	14,8	1,9	0,5	5,7	21,5	5 955
Quintil de riqueza															
Quintil inferior	4,3	9,2	7,6	7,1	14,9	14,0	7,2	1,7	0,7	9,8	0,6	0,1	4,1	11,6	875
Segundo quintil	5,8	14,4	9,1	9,5	21,6	16,5	13,2	4,2	1,2	13,6	1,1	0,3	4,9	16,7	1 922
Quintil intermedio	4,4	16,8	13,6	10,1	28,4	19,6	19,6	5,7	1,5	14,0	1,4	0,3	5,1	21,0	3 101
Cuarto quintil	4,3	17,0	15,4	9,9	31,4	22,3	24,8	6,3	2,0	14,2	1,4	0,5	3,8	20,4	3 807
Quintil superior	4,4	20,6	19,1	11,7	38,6	26,3	29,6	9,9	1,6	14,5	2,0	0,5	4,8	20,6	4 312
Total 2011	4,6	17,3	14,8	10,3	30,6	21,6	22,4	6,7	1,6	13,9	1,5	0,4	4,6	19,5	14 019
Total 2000	7,1	14,6	10,4	10,8	23,7	13,4	15,0	3,9	2,2	31,8	3,4	nd	8,5	30,2	13 766

1/ A partir del año 2004 en la variable secreción vaginal incluye secreción de flujo por la vagina y secreción/goteos en genitales.

nd= No disponible.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO N° 11.5B

PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2011
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Síntomas y signos de las infecciones de transmisión sexual (ITS)														Número de mujeres
	Dolor abdominal	Secreción por genital 1/	Secreción maloliente	Molestia al orinar	Enrojecimiento/Picazón en genitales	Inflamación o hinchazón en genitales	Úlceras/Llagas genitales	Verrugas genitales	Sangre en la orina	Pérdida de peso	Puede no haber síntomas	Impotencia/Infertilidad	Secreción o pus por el pene	Otros síntomas	
Área de residencia															
Urbana	4,6	18,1	15,5	10,7	32,1	22,5	24,1	7,1	1,6	14,1	1,6	0,4	4,7	20,2	12 226
Rural	4,6	11,6	10,3	7,4	20,4	15,8	10,8	4,0	1,2	12,7	0,9	0,3	3,9	15,1	1 792
Región natural															
Lima Metropolitana	4,1	17,4	14,3	10,4	34,2	26,2	28,0	7,8	2,0	14,4	1,9	0,4	3,6	21,5	5 612
Resto Costa	4,2	17,6	15,2	8,8	32,2	19,8	22,2	6,8	1,1	15,7	0,9	0,4	4,5	22,6	3 370
Sierra	5,0	14,5	13,6	9,0	24,5	16,1	16,4	6,4	1,5	12,1	1,2	0,4	1,7	15,5	3 361
Selva	6,4	21,6	17,7	15,3	27,3	20,9	16,3	3,4	1,2	12,0	2,0	0,4	13,9	14,8	1 675
Departamento															
Amazonas	7,4	15,3	16,4	9,7	25,0	20,9	19,7	7,2	1,2	13,9	3,6	1,4	5,6	19,2	150
Áncash	2,2	7,9	13,2	8,7	23,0	22,6	11,2	4,9	1,7	14,6	0,6	0,0	2,8	22,2	690
Apurímac	9,9	16,1	5,5	5,6	18,2	10,1	15,9	4,2	0,0	10,8	0,0	0,3	1,1	28,3	122
Arequipa	1,2	10,9	14,7	8,7	23,2	12,9	14,7	9,3	0,5	11,6	0,9	0,0	0,9	11,0	699
Ayacucho	5,9	16,7	13,7	6,8	30,0	15,9	26,3	5,3	2,2	8,7	2,5	0,9	1,7	12,1	248
Cajamarca	8,4	24,7	19,4	14,6	27,8	16,1	14,6	3,9	1,3	16,0	0,0	0,8	1,1	14,7	284
Cusco	6,9	13,4	12,2	9,8	26,0	14,7	18,8	7,0	0,6	8,5	2,2	0,5	0,9	15,1	484
Huancavelica	6,2	10,4	9,7	8,9	10,4	6,3	8,9	6,8	10,7	36,5	1,3	0,8	5,2	15,4	82
Huánuco	6,6	17,0	22,5	12,7	33,9	22,4	17,3	5,7	2,7	10,1	1,6	0,0	3,2	6,0	282
Ica	3,4	20,9	14,5	9,3	36,5	21,3	22,6	13,2	1,4	9,3	1,3	0,2	8,3	19,9	467
Junín	4,1	19,7	12,6	5,9	27,4	17,7	21,4	6,9	0,8	14,3	1,8	0,6	4,5	21,9	694
La Libertad	6,4	19,6	18,1	8,7	27,7	13,1	18,4	1,0	0,8	14,0	0,0	0,0	0,6	11,2	436
Lambayeque	6,8	13,4	9,3	7,0	28,2	13,4	22,0	2,5	0,9	24,0	1,2	0,2	4,5	18,4	593
Lima	4,0	17,3	14,6	10,1	33,9	26,3	27,9	7,8	1,8	14,3	1,7	0,5	3,4	21,5	6 098
Loreto	5,6	25,1	16,2	12,1	16,3	16,1	11,2	1,3	0,8	13,5	0,8	0,0	9,9	18,1	399
Madre de Dios	5,1	10,3	20,9	10,8	20,0	8,3	17,4	3,9	0,7	10,9	0,5	0,4	3,4	14,3	74
Moquegua	1,9	19,6	19,8	10,4	29,7	21,8	16,4	8,0	1,1	12,1	1,1	0,2	4,0	19,4	101
Pasco	10,6	16,8	25,6	22,6	34,7	26,2	18,6	6,9	0,0	15,8	1,3	0,5	1,3	16,9	90
Piura	3,5	18,5	15,2	6,3	33,4	21,0	24,0	6,6	1,6	15,6	1,2	1,0	3,2	31,7	719
Puno	4,2	11,6	13,0	16,3	25,7	9,7	9,3	3,3	2,2	12,1	0,0	0,9	1,4	13,4	283
San Martín	9,7	21,5	22,1	24,0	39,2	32,3	14,8	3,4	2,1	11,5	3,0	0,8	20,5	13,9	457
Tacna	4,2	20,4	12,0	13,9	35,8	10,6	21,5	15,0	0,6	11,2	3,2	0,0	4,8	23,8	179
Tumbes	7,5	28,3	12,2	13,6	43,7	32,1	29,4	2,2	3,8	18,6	1,0	0,2	16,6	31,9	128
Ucayali	3,3	31,2	15,6	13,5	19,6	18,6	23,7	5,1	0,7	5,1	2,7	0,2	29,3	10,5	260
Total 2011	4,6	17,3	14,8	10,3	30,6	21,6	22,4	6,7	1,6	13,9	1,5	0,4	4,6	19,5	14 019
Total 2000	7,1	14,6	10,4	10,8	23,7	13,4	15,0	3,9	2,2	31,8	3,4	nd	8,5	30,2	13 766

1/ A partir del año 2004 en la variable secreción vaginal incluye secreción de flujo por la vagina y secreción/goteos en genitales.

nd= No disponible.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

11.4 PREVALENCIA DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

A las mujeres entrevistadas se les hizo una serie de preguntas para disponer de información que facilite la estimación de la prevalencia de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). En particular, a cada mujer entrevistada se le preguntó si en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista le diagnosticaron alguna infección de transmisión sexual, si había tenido algún flujo o secreción genital, si había tenido llaga o úlceras en sus genitales y, a las que tuvieron alguno de esos problemas se les preguntó a quién acudió en búsqueda de consejo o tratamiento. El detalle de los resultados por características seleccionadas se presenta en los Cuadros 11.6A, 11.6B, 11.7A y 11.7B.

Prevalencia de ITS (Cuadros 11.6A y 11.6B)

- Entre las mujeres entrevistadas que respondieron haber mantenido relaciones sexuales, el 0,6 por ciento informó haber tenido una ITS y/o síntomas asociados en los 12 meses anteriores a la entrevista. En la ENDES 2000 fue 0,9 por ciento.
- Según características de las mujeres que respondieron haber padecido una ITS, el mayor porcentaje aparece en las solteras que han tenido relaciones sexuales (1,0 por ciento).
- Los departamentos, que registraron los más altos porcentaje de mujeres con episodios de ITS fueron: Moquegua (2,2 por ciento) y San Martín (1,7 por ciento), Loreto (1,2 por ciento).
- El 13,8 por ciento de mujeres declaró tener una ITS o Flujo vaginal o úlceras/ llagas genitales, porcentaje reducido en 11,3 puntos porcentuales, respecto al año 2000 (25,1 por ciento). El mayor porcentaje fue declarado por mujeres de 20 a 24 y 25 a 29 años de edad (15,8 y 15,2 por ciento, respectivamente), con educación secundaria (15,5 por ciento) y, ubicadas en el segundo y tercer quintil de riqueza (15,2 por ciento, en cada caso). Por departamento, fue mayor en Cusco (19,7 por ciento), Tacna (19,3 por ciento) y Ayacucho (18,9 por ciento).

CUADRO Nº 11.6A
PERÚ: MUJERES POR PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SÍNTOMAS DE ITS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Informó ITS o sintoma			Porcentaje de mujeres con una ITS o Flujo vaginal o úlceras/lagas	Número de mujeres
	Porcentaje con una ITS	Porcentaje con flujo vaginal	Úlceras/Llagas genitales		
Edad					
15-19	0,9	11,5	2,2	13,5	1 118
20-24	0,9	14,3	1,4	15,8	2 595
25-29	0,7	14,0	0,9	15,2	3 030
30-39	0,7	12,6	2,1	13,9	6 228
40-49	0,4	11,1	1,6	12,0	5 152
15-24	0,9	13,5	1,6	15,1	3 713
Estado conyugal					
Soltera ha tenido RS	1,0	12,1	1,1	13,6	3 036
Casada o Conviviente	0,6	12,5	1,8	13,8	12 673
Divorciada/Separada/Viuda	0,5	13,3	1,8	14,2	2 415
Nivel de educación					
Sin educación	0,3	10,0	1,8	10,5	577
Primaria	0,5	12,9	2,1	14,0	4 610
Secundaria	0,7	14,0	1,9	15,5	7 484
Superior	0,7	10,6	0,9	11,7	5 451
Quintil de riqueza					
Quintil inferior	0,4	10,2	1,3	10,9	2 913
Segundo quintil	0,5	14,2	1,4	15,2	3 543
Quintil intermedio	0,9	13,4	2,0	15,2	3 983
Cuarto quintil	0,7	13,0	2,0	14,4	3 865
Quintil superior	0,6	11,5	1,5	12,6	3 819
Total 2011	0,6	12,6	1,7	13,8	18 123
Total 2000	0,9	22,9	3,4	25,1	20 704

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO N° 11.6B


PERÚ: MUJERES POR PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SÍNTOMAS DE ITS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2011

(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Informó ITS o síntoma			Porcentaje de mujeres con una ITS o Flujo vaginal o úlceras/lagas	Número de mujeres
	Porcentaje con una ITS	Porcentaje con flujo vaginal	Úlceras/Lagas genitales		
Área de residencia					
Urbana	0,7	12,7	1,7	14,0	13 352
Rural	0,5	12,3	1,4	13,1	4 771
Región natural					
Lima Metropolitana	0,8	14,2	2,5	16,0	5 543
Resto Costa	0,4	10,0	1,5	11,0	4 298
Sierra	0,5	14,4	1,3	15,3	5 930
Selva	0,9	8,9	0,9	10,1	2 352
Departamento					
Amazonas	0,4	6,2	0,8	6,8	244
Áncash	0,9	16,5	3,3	18,0	754
Apurímac	0,6	17,5	0,5	18,4	298
Arequipa	0,2	12,2	0,5	12,4	767
Ayacucho	0,4	18,1	2,6	18,9	515
Cajamarca	0,4	8,0	0,3	8,6	835
Cusco	0,2	18,7	1,7	19,7	774
Huancavelica	0,4	12,9	0,1	13,3	317
Huánuco	1,0	10,2	0,6	11,4	492
Ica	0,4	4,8	0,9	5,7	535
Junín	0,8	13,3	1,2	14,4	856
La Libertad	0,1	9,6	0,0	9,8	906
Lambayeque	0,1	9,1	1,1	9,5	786
Lima	0,9	14,5	2,4	16,2	6 122
Loreto	1,2	6,9	0,3	8,2	577
Madre de Dios	0,3	10,7	2,0	11,5	109
Moquegua	2,2	12,7	2,6	16,3	104
Pasco	0,5	10,7	1,0	11,9	160
Piura	0,3	8,4	2,1	10,1	1 044
Puno	0,3	17,1	2,1	17,9	769
San Martín	1,7	8,4	1,5	11,0	509
Tacna	0,8	17,8	2,0	19,3	213
Tumbes	0,3	8,7	3,6	11,5	146
Ucayali	0,8	6,3	0,4	7,4	288
Total 2011	0,6	12,6	1,7	13,8	18 123
Total 2000	0,9	22,9	3,4	25,1	20 704


Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

GRÁFICO 11.5
PERÚ: PRESENCIA DE ITS Y/O SÍNTOMAS ASOCIADOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011
(Porcentaje)



Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

GRÁFICO 11.6
PERÚ: PORCENTAJE DE MUJERES CON UNA ITS O FLUJO VAGINAL O,
ÚLCERAS/LLAGAS, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA, 2000 Y 2011
(Porcentaje)



Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Fuente de consejo o tratamiento de las ITS (Cuadros 11.7A y 11.7B)

- Entre las mujeres que tuvieron una ITS en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista, el 66,7 por ciento buscó consejo o tratamiento por un médico y un 78,3 por ciento recibió de cualquier fuente en comparación con un 11,7 por ciento que no recibió ni consejo ni tratamiento y un 4,5 por ciento se autorecetó, es decir, utilizó medicamentos por su cuenta. Otras fuentes mencionadas fueron los curanderos (5,6 por ciento) y las farmacias/boticas (19,9 por ciento).
- Las mujeres de 15 a 19 años de edad fueron las que acudieron en menor porcentaje, a un médico (48,7 por ciento), al igual que las solteras con actividad sexual (57,9 por ciento), Sierra (62,8 por ciento), con educación primaria (62,1 por ciento) y del primer quintil de riqueza (59,7 por ciento). Por área de residencia fue 62,7 por ciento en el área rural.
- Las entrevistadas que en mayor porcentaje acudieron a un médico fueron las mujeres entre 25 y 29 años de edad (71,1 por ciento), casada/conviviente (69,6 por ciento), que vivían en Lima metropolitana (70,0 por ciento), con educación superior (77,2 por ciento) y del quinto quintil de riqueza (77,7 por ciento).
- Al curandero acudieron, mayormente, mujeres sin educación (10,4 por ciento) y del quinto quintil de riqueza (9,8 por ciento). Por estado conyugal fueron las casadas o convivientes (6,0 por ciento) y divorciada/separada/viuda (5,5 por ciento). Por ámbito geográfico, del área rural (9,4 por ciento) y de la sierra (8,9 por ciento).
- A la farmacia/botica acudieron más las mujeres del quintil intermedio de riqueza (25,1 por ciento), de 20 a 24 años de edad (23,3 por ciento) y, solteras con actividad sexual (23,1 por ciento). Por área de residencia el mayor porcentaje estuvo en la urbana (21,3 por ciento). Por región natural, en Lima Metropolitana (22,0 por ciento) y, por departamento en Madre de Dios (41,8 por ciento).
- Dado que podía mencionarse más de una fuente de atención, es muy probable que las mujeres acudan a cada una de estas fuentes de tratamiento de acuerdo con las circunstancias específicas, estas deberían evaluarse a futuro para conocimiento y definición de políticas.

CUADRO N° 11.7A
PERÚ: MUJERES QUE RECIBIERON CONSEJO O TRATAMIENTO PARA UNA ITS, POR FUENTE DE TRATAMIENTO, SEGÚN
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Fuente de tratamiento de ITS 1/				Consejo o tratamiento de amigos o familiares	Se auto-recetó	Ni consejo ni tratamiento	Número de mujeres con una ITS 2/
	Médico	Curandero	Farmacia / Botica	Consejo o tratamiento de cualquier fuente				
Edad								
15-19	48,7	2,5	21,4	62,4	17,9	4,1	15,6	151
20-24	61,5	4,7	23,3	74,9	8,5	2,2	14,3	411
25-29	71,1	4,7	20,0	81,6	5,7	2,1	10,6	460
30-39	72,6	6,0	20,8	82,9	3,5	5,5	8,1	863
40-49	63,0	7,2	15,8	75,6	3,2	6,5	14,7	617
15-24	58,1	4,1	22,8	71,6	11,1	2,7	14,7	562
Estado conyugal								
Soltera ha tenido RS	57,9	4,1	23,1	73,5	10,2	3,1	13,2	413
Casada o Conviviente	69,6	6,0	18,9	80,3	4,2	4,8	10,6	1 746
Divorciada/Separada/Viuda	62,2	5,5	21,1	73,7	6,5	4,5	15,2	343
Nivel de educación								
Sin educación	64,4	10,4	14,7	70,2	7,9	4,5	17,4	60
Primaria	62,1	9,2	19,1	76,4	6,7	5,4	11,6	647
Secundaria	63,5	4,5	20,4	74,7	5,8	5,3	14,2	1 157
Superior	77,2	3,6	20,2	87,4	3,7	2,3	6,6	638
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	59,7	9,8	12,0	68,7	6,6	8,3	16,4	316
Segundo quintil	60,0	8,0	21,2	73,7	8,9	5,1	12,3	538
Quintil intermedio	65,4	5,4	25,1	80,9	4,8	2,5	11,8	607
Cuarto quintil	69,0	3,1	18,3	78,5	5,9	3,8	11,8	558
Quintil superior	77,7	3,5	18,8	86,2	1,6	4,6	7,6	481
Total 2011	66,7	5,6	19,9	78,3	5,5	4,5	11,7	2 501
Total 2000	63,0	6,2	13,8	71,4	2,7	10,1	15,9	5 199

1/ Las entrevistadas podían informar más de una fuente de tratamiento.

2/ Incluye las mujeres que informaron tener una ITS o flujo vaginal o llagas/granos genitales, en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO Nº 11.7B
PERÚ: MUJERES QUE RECIBIERON CONSEJO O TRATAMIENTO PARA UNA ITS, POR FUENTE DE TRATAMIENTO, SEGÚN
ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2011
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Fuente de tratamiento de ITS 1/				Consejo o tratamiento de amigos o familiares	Se auto-recetó	Ni consejo ni tratamiento	Número de mujeres con una ITS 2/
	Médico	Curandero	Farmacia / Botica	Consejo o tratamiento de cualquier fuente				
Área de residencia								
Urbana	68,0	4,4	21,3	80,1	5,6	3,8	10,5	1 875
Rural	62,7	9,4	15,5	72,9	5,3	6,7	15,1	626
Región natural								
Lima Metropolitana	70,0	2,9	22,0	79,6	5,4	3,2	11,9	884
Resto Costa	66,7	4,4	20,5	80,8	4,8	2,5	11,9	474
Sierra	62,8	8,9	17,3	75,1	5,9	7,1	11,9	906
Selva	69,0	5,8	20,6	81,0	6,0	3,6	9,4	237
Departamento								
Amazonas	78,5	17,6	29,5	87,9	0,0	2,3	9,9	17
Áncash	69,2	9,2	21,1	79,4	8,3	4,6	7,6	136
Apurímac	76,6	7,9	14,6	84,8	7,8	3,8	3,6	55
Arequipa	70,3	0,0	11,9	79,6	0,0	7,8	12,6	95
Ayacucho	67,8	7,0	21,2	81,7	3,8	5,2	9,4	97
Cajamarca	68,0	8,3	13,1	74,8	7,1	0,0	18,0	72
Cusco	57,8	3,5	23,2	67,4	6,3	17,6	8,8	152
Huancavelica	63,9	7,7	16,5	76,4	6,2	11,4	6,1	42
Huánuco	58,9	7,0	23,3	75,0	4,1	4,0	16,8	56
Ica	(73,0)	(0,0)	(23,2)	(78,6)	(12,1)	(4,9)	(4,4)	(30,7)
Junín	72,8	6,7	18,2	83,6	4,9	3,3	8,2	123
La Libertad	64,0	10,6	16,2	81,8	0,0	0,0	18,2	89
Lambayeque	62,3	4,1	20,1	78,6	5,8	1,5	14,2	74
Lima	70,0	2,6	21,8	79,5	6,0	3,1	11,4	989
Loreto	68,6	6,2	11,3	79,7	11,2	3,0	6,1	47
Madre de Dios	65,3	12,4	41,8	86,9	3,7	2,8	6,6	13
Moquegua	67,3	7,3	16,7	83,7	0,0	3,3	13,1	17
Pasco	65,2	15,3	15,1	80,9	3,2	3,4	12,5	19
Piura	63,9	7,5	24,7	81,7	5,8	2,2	10,4	106
Puno	42,0	16,6	13,3	61,8	4,9	6,4	26,9	137
San Martín	70,5	6,2	18,4	84,7	6,4	6,5	2,5	56
Tacna	58,3	11,6	14,4	74,3	2,8	2,7	20,3	41
Tumbes	72,6	3,6	13,6	80,3	6,1	2,5	11,1	17
Ucayali	79,2	4,6	28,3	88,9	7,6	3,5	0,0	21
Total 2011	66,7	5,6	19,9	78,3	5,5	4,5	11,7	2 501
Total 2000	63,0	6,2	13,8	71,4	2,7	10,1	15,9	5 199

Nota: Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*) y las de 25-49 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis.

1/ Las entrevistadas podían informar más de una fuente de tratamiento.

2/ Incluye las mujeres que informaron tener una ITS o flujo vaginal o llagas/granos genitales, en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

11.5 CONDUCTA SEXUAL, USO DEL CONDÓN Y ACCESO AL CONDÓN

La conducta sexual individual y el uso de condón son determinantes claves del estatus de riesgo de contraer ITS y cuando esta información se agrega a nivel de la población, permite describir el contexto en el cual se deben diseñar e implementar los programas preventivos y curativos del VIH e ITS. En la ENDES 2011, se preguntó a las mujeres acerca de sus relaciones sexuales en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista, número de parejas sexuales, uso de condón en la última relación y conocimiento de fuentes. Asimismo se indagó acerca del nivel de conocimiento de la mujer respecto a la persona con quien mantuvo contacto sexual, para distinguir la pareja sexual regular de la no regular, cohabitante o no. Los resultados se detallan en los Cuadros 11.8A al 11.10B.

Número de parejas sexuales de las mujeres no unidas (Cuadros 11.8A y 11.8B)

- La distribución porcentual de mujeres no unidas por el número de personas con quienes tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista muestra que el 69,6 por ciento refirió no haber tenido pareja sexual (61,4 por ciento en el año 2000), 28,4 por ciento respondió haber tenido una pareja (38,3 por ciento en el año 2000), y 2,0 por ciento tuvo dos o más parejas (0,3 por ciento en el año 2000).
- Las mujeres entre 15 y 19 años de edad un 86,2 por ciento respondieron no haber tenido pareja sexual y entre las mujeres de 15 a 24 años de edad este porcentaje fue 75,8 por ciento.
- El departamento en el que se registró el mayor porcentaje de mujeres que respondió "ninguna pareja" fue Cajamarca (88,1 por ciento), con una pareja fue Madre de Dios (42,9 por ciento) y, con dos o más parejas fue Ucayali (7,2 por ciento).
- El área rural (82,7 por ciento) y la Sierra (79,5 por ciento) fueron los ámbitos donde se encontró un mayor porcentaje de mujeres que respondió no haber tenido pareja sexual, en los últimos 12 meses. Esta característica también se encontró más alta entre las mujeres sin educación (86,5 por ciento) y del primer quintil de riqueza (85,5 por ciento).

CUADRO N° 11.8A
PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE LAS MUJERES NO UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011
(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	Número de parejas sexuales			Promedio de parejas	Número de mujeres
		Ninguna pareja	1	2 y más		
Edad						
15-19	100,0	86,2	12,9	0,9	0,1	3 686
20-24	100,0	57,2	39,7	3,1	0,5	2 071
25-29	100,0	51,8	43,8	4,4	0,6	1 192
30-39	100,0	57,6	40,7	1,7	0,4	1 619
40-49	100,0	73,4	24,8	1,8	0,3	1 276
15-24	100,0	75,8	22,5	1,7	0,3	5 756
Estado conyugal						
Soltera ha tenido RS	100,0	30,7	65,4	3,9	0,7	3 035
Soltera no ha tenido RS	100,0	100,0	n.a.	n.a.	n.a.	4 394
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	63,1	33,5	3,4	0,4	2 415
Nivel de educación						
Sin educación	100,0	86,5	13,5	0,0	0,1	132
Primaria	100,0	80,1	19,4	0,5	0,2	1 149
Secundaria	100,0	76,9	21,2	1,9	0,3	5 134
Superior	100,0	54,5	42,6	2,9	0,5	3 429
Quintil de riqueza						
Quintil inferior	100,0	85,5	13,7	0,7	0,2	1 124
Segundo quintil	100,0	76,7	22,0	1,3	0,2	1 600
Quintil intermedio	100,0	71,1	27,4	1,5	0,3	2 047
Cuarto quintil	100,0	65,9	31,1	2,9	0,4	2 394
Quintil superior	100,0	60,8	36,6	2,7	0,4	2 679
Total 2011	100,0	69,6	28,4	2,0	0,3	9 844
Total 2000	100,0	61,4	38,3	0,3	0,4	12 215

na= No aplicable.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO N° 11.8B

PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE LAS MUJERES NO UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2011

(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	Número de parejas sexuales			Promedio de parejas	Número de mujeres
		Ninguna pareja	1	2 y más		
Área de residencia						
Urbana	100,0	66,6	31,0	2,3	0,4	8 032
Rural	100,0	82,7	16,5	0,8	0,2	1 812
Región natural						
Lima Metropolitana	100,0	63,1	34,0	2,9	0,4	3 583
Resto Costa	100,0	70,4	28,2	1,4	0,3	2 427
Sierra	100,0	79,5	19,6	0,9	0,2	2 927
Selva	100,0	60,9	35,0	4,1	0,4	907
Departamento						
Amazonas	100,0	74,6	23,9	1,5	0,3	94
Áncash	100,0	71,4	28,1	0,5	0,3	376
Apurímac	100,0	81,3	17,4	1,3	0,2	145
Arequipa	100,0	74,5	24,7	0,8	0,3	398
Ayacucho	100,0	79,4	19,4	1,2	0,2	259
Cajamarca	100,0	88,1	11,9	0,0	0,1	407
Cusco	100,0	72,8	25,1	2,2	0,3	350
Huancavelica	100,0	87,2	12,5	0,3	0,1	156
Huánuco	100,0	73,6	25,2	1,2	0,3	243
Ica	100,0	63,4	34,7	1,8	0,4	280
Junín	100,0	72,4	25,8	1,8	0,3	427
La Libertad	100,0	74,0	25,3	0,7	0,3	522
Lambayeque	100,0	72,4	26,5	1,0	0,3	500
Lima	100,0	63,8	33,3	2,8	0,4	3 871
Loreto	100,0	57,4	35,9	6,7	0,5	225
Madre de Dios	100,0	54,1	42,9	3,0	0,5	42
Moquegua	100,0	70,6	26,9	2,5	0,3	50
Pasco	100,0	71,5	27,2	1,3	0,3	74
Piura	100,0	70,4	27,9	1,7	0,3	552
Puno	100,0	87,3	12,7	0,0	0,1	361
San Martín	100,0	57,9	39,2	2,9	0,4	202
Tacna	100,0	66,6	29,9	3,5	0,4	129
Tumbes	100,0	75,3	23,7	1,1	0,3	59
Ucayali	100,0	53,3	39,4	7,2	0,5	120
Total 2011	100,0	69,6	28,4	2,0	0,3	9 844
Total 2000	100,0	61,4	38,3	0,3	0,4	12 215

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Número de parejas sexuales de mujeres unidas (Cuadros 11.8.1A y 11.8.1B)

- Evaluando la distribución porcentual de mujeres actualmente casadas o convivientes por número de personas con las que han tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista, se observa que la gran mayoría (97,9 por ciento) refirió haber tenido una sola pareja sexual incluyendo el esposo/compañero, lo cual se refuerza con el gran porcentaje de mujeres que manifestaron no haber tenido parejas sexuales (99,5 por ciento) excluyendo el esposo/compañero; en tanto, el 0,3 por ciento ha tenido dos o más parejas sexuales incluyendo el esposo/compañero.
- Entre las mujeres que, incluyendo al esposo/compañero, aceptaron haber tenido dos o más parejas sexuales, un mayor porcentaje tenía de 15 a 19 años de edad (1,7 por ciento). Por área de residencia, en la urbana (0,3 por ciento). Por región natural, la Selva (0,6 por ciento) y, por departamento Loreto (1,7 por ciento) y Moquegua (1,0 por ciento).
- Considerando que el número de parejas sexuales es un factor de riesgo, la mayoría de mujeres que adquirieron el VIH lo hicieron con su única pareja sexual.

CUADRO N° 11.8.1A

PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011

(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Número de parejas sexuales incluyendo esposo/compañero					Número de parejas sexuales excluyendo esposo/compañero					Número de mujeres
	Total	0	1	2 y más	Pro-medio	Total	0	1	Pro-medio		
Edad											
15-19	100,0	0,6	97,8	1,7	1,0	100,0	95,2	4,8	0,1	432	
20-24	100,0	0,3	99,4	0,4	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	1 379	
25-29	100,0	1,2	98,6	0,2	1,0	100,0	99,8	0,1	0,0	2 100	
30-39	100,0	1,4	98,3	0,2	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	4 787	
40-49	100,0	3,4	96,4	0,2	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	3 975	
15-24	100,0	0,4	99,0	0,7	1,0	100,0	98,6	1,4	0,0	1 810	
Nivel de educación											
Sin educación	100,0	3,4	96,6	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	464	
Primaria	100,0	1,8	97,9	0,2	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	3 839	
Secundaria	100,0	1,5	98,0	0,4	1,0	100,0	99,2	0,7	0,0	5 287	
Superior	100,0	2,2	97,7	0,1	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	3 082	
Quintil de riqueza											
Quintil inferior	100,0	1,7	98,1	0,2	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	2 359	
Segundo quintil	100,0	1,3	98,5	0,2	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	2 764	
Quintil intermedio	100,0	1,7	97,8	0,4	1,0	100,0	99,1	0,9	0,0	2 827	
Cuarto quintil	100,0	2,4	97,3	0,3	1,0	100,0	99,6	0,3	0,0	2 498	
Quintil superior	100,0	2,4	97,5	0,2	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	2 225	
Total 2011	100,0	1,9	97,9	0,3	1,0	100,0	99,5	0,4	0,0	12 673	

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO Nº 11.8.1B

PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2011

(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Número de parejas sexuales incluyendo esposo/compañero					Número de parejas sexuales excluyendo esposo/compañero				Número de mujeres
	Total	0	1	2 y más	Pro-medio	Total	0	1	Pro-medio	
Área de residencia										
Urbana	100,0	2,1	97,6	0,3	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	8 769
Rural	100,0	1,4	98,5	0,1	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	3 904
Región natural										
Lima Metropolitana	100,0	2,6	97,2	0,3	1,0	100,0	99,2	0,8	0,0	3 383
Resto Costa	100,0	1,5	98,1	0,4	1,0	100,0	99,4	0,5	0,0	2 987
Sierra	100,0	1,6	98,4	0,0	1,0	100,0	99,9	0,1	0,0	4 546
Selva	100,0	1,7	97,6	0,6	1,0	100,0	99,3	0,6	0,0	1 757
Departamento										
Amazonas	100,0	1,3	98,3	0,4	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	193
Áncash	100,0	1,1	98,9	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	556
Apurímac	100,0	2,2	97,8	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	233
Arequipa	100,0	1,3	98,7	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	566
Ayacucho	100,0	1,3	98,7	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	399
Cajamarca	100,0	1,8	98,2	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	636
Cusco	100,0	2,2	97,8	0,0	1,0	100,0	99,9	0,1	0,0	609
Huancavelica	100,0	1,3	98,7	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	250
Huánuco	100,0	2,5	97,5	0,0	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	355
Ica	100,0	1,3	98,7	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	363
Junín	100,0	2,4	97,1	0,5	1,0	100,0	99,5	0,3	0,0	624
La Libertad	100,0	1,1	98,9	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	629
Lambayeque	100,0	1,1	98,9	0,0	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	543
Lima	100,0	2,6	97,0	0,4	1,0	100,0	99,1	0,8	0,0	3 800
Loreto	100,0	3,6	94,7	1,7	1,0	100,0	98,3	1,7	0,0	422
Madre de Dios	100,0	2,4	97,1	0,5	1,0	100,0	99,1	0,9	0,0	79
Moquegua	100,0	1,4	97,6	1,0	1,0	100,0	99,0	0,8	0,1	77
Pasco	100,0	0,9	99,1	0,0	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	122
Piura	100,0	0,9	98,6	0,6	1,0	100,0	99,3	0,7	0,0	757
Puno	100,0	0,8	99,2	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	625
San Martín	100,0	0,7	98,9	0,4	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	373
Tacna	100,0	3,2	96,5	0,3	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	138
Tumbes	100,0	0,2	99,3	0,5	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	115
Ucayali	100,0	1,3	98,5	0,2	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	207
Total 2011	100,0	1,9	97,9	0,3	1,0	100,0	99,5	0,4	0,0	12 673

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Conocimiento y uso del condón (Cuadros 11.9A y 11.9B)

- Entre las mujeres que han oído hablar sobre el VIH/SIDA, el 98,7 por ciento conocía sobre el uso de condón, como una forma de prevenir enfermedades, pero solo el 9,9 por ciento utilizó el último mes. De las mujeres que lo usan como método anticonceptivo (2,6 por ciento) no los utilizó en su última relación sexual.
- El 79,2 por ciento de mujeres conocía que hay fuente médica pública y un 2,8 por ciento fuente médica privada. El 76,6 por ciento, sabía que se adquiere en las farmacias contra un 2,0 por ciento que no conoce fuentes para obtenerlos.
- Es importante mencionar que las mujeres que reconocieron haber utilizado condones en el último mes fueron las que tuvieron educación superior (15,1 por ciento), pertenecientes al quinto quintil de riqueza (14,1 por ciento) y, las solteras que han tenido relaciones sexuales (13,4 por ciento).
- En cuanto al grupo que usa el condón como método de planificación familiar pero que no los usó en su última relación sexual, fue mayor en el área urbana (3,1 por ciento), Lima Metropolitana (3,7 por ciento); con educación secundaria (3,4 por ciento) y del cuarto y quinto quintil de riqueza (3,6 por ciento, en ambos casos).
- Se puede resumir que un porcentaje importante de mujeres entrevistadas conoce acerca de la existencia del condón, no obstante su uso frecuente y sostenido no es una práctica común, y fueron las mujeres solteras que han tenido relaciones sexuales, las que presentaron mayores porcentajes de uso en comparación con las divorciadas/separadas/ viudas y casadas o convivientes.

CUADRO Nº 11.9A
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO, FUENTE Y USO DEL CONDÓN, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Conoce sobre el condón 1/	Conoce fuente para el condón 2/					No conoce fuentes para el condón	Uso de condones		Usa condón para PF; pero no usó en última relación	Número de mujeres
		Fuente médica pública	Fuente médica privada	Farmacia	Otra fuente	Podría conseguir uno		El último mes	Antes		
Edad											
15-19	98,6	76,5	2,5	79,5	6,9	59,9	2,6	9,6	9,8	3,7	1 063
20-24	98,5	77,0	3,1	83,8	9,7	70,0	1,5	12,2	7,7	3,7	2 517
25-29	98,8	81,1	3,9	79,2	8,5	69,1	1,8	11,7	4,2	2,9	2 936
30-39	98,9	81,7	2,6	75,2	7,5	67,9	1,7	10,5	2,1	2,9	6 008
40-49	98,4	76,7	2,5	72,5	6,4	61,3	2,6	6,9	1,1	1,5	4 904
15-24	98,5	76,8	2,9	82,5	8,9	67,0	1,8	11,4	8,3	3,7	3 580
Estado conyugal											
Soltera ha tenido RS	99,1	69,5	4,7	88,9	13,2	71,2	1,2	13,4	12,5	3,5	2 964
Casada o Conviviente	98,6	81,5	2,3	72,8	6,3	64,6	2,2	10,2	1,0	2,7	12 118
Divorciada/Separada/Viuda	98,5	79,5	3,4	80,9	7,4	67,0	1,8	3,8	4,7	1,1	2 346
Nivel de educación											
Sin educación	89,5	81,1	0,6	21,2	1,1	29,7	15,9	1,1	0,1	0,0	381
Primaria	96,4	85,3	1,1	48,4	2,5	46,5	5,6	4,3	0,6	0,9	4 155
Secundaria	99,6	81,0	2,3	82,9	6,3	68,2	0,6	9,6	3,3	3,4	7 442
Superior	99,8	71,9	5,0	93,3	13,9	80,6	0,1	15,1	6,1	3,2	5 450
Quintil de riqueza											
Quintil inferior	94,5	89,1	1,1	28,7	1,7	41,3	8,6	2,9	0,5	0,8	2 398
Segundo quintil	98,2	88,0	2,2	66,6	3,2	57,4	2,2	6,6	1,7	1,7	3 431
Quintil intermedio	99,6	82,5	2,2	84,6	6,0	68,1	0,8	9,9	3,5	2,7	3 940
Cuarto quintil	99,6	76,8	3,0	89,1	8,7	73,0	0,6	13,0	3,8	3,6	3 848
Quintil superior	99,8	64,0	5,0	94,8	16,0	80,4	0,1	14,1	6,5	3,6	3 812
Total 2011	98,7	79,2	2,8	76,6	7,6	66,1	2,0	9,9	3,4	2,6	17 428
Total 2000	97,5	65,1	3,4	58,2	5,8	53,1	10,9	5,7	2,1	0,9	17 800

1/ Conocimiento para Planificación Familiar o para prevención de enfermedades.

2/ Para las usuarias actuales se incluye como fuente el último sitio donde obtuvo el condón.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO N° 11.9B

PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO, FUENTE Y USO DEL CONDÓN, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2011

(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Conoce sobre el condón 1/	Conoce fuente para el condón 2/					No conoce fuentes para el condón	Uso de condones		Usa condón para PF; pero no usó en última relación	Número de mujeres
		Fuente médica pública	Fuente médica privada	Farmacia	Otra fuente	Podría conseguir uno		El último mes	Antes		
Área de residencia											
Urbana	99,4	75,7	3,2	87,5	9,3	71,5	0,9	11,6	4,2	3,1	13 240
Rural	96,3	90,1	1,6	42,2	2,4	48,8	5,5	4,4	1,0	1,4	4 188
Región natural											
Lima Metropolitana	99,6	67,7	4,8	92,3	13,8	76,5	0,4	14,5	5,0	3,7	5 526
Resto Costa	99,5	79,0	1,6	84,0	5,5	67,5	1,1	8,8	2,6	1,9	4 247
Sierra	97,0	86,0	2,2	58,5	4,2	56,0	4,0	7,7	2,9	2,1	5 389
Selva	98,6	91,1	2,0	67,4	5,1	61,7	2,4	5,7	2,6	2,6	2 266
Departamento											
Amazonas	96,8	91,3	1,2	58,1	3,6	51,1	4,9	5,7	1,2	0,3	229
Áncash	99,1	91,2	4,0	64,0	5,7	60,9	1,8	6,3	2,4	1,1	731
Apurímac	98,5	97,4	3,8	55,8	1,8	58,0	1,7	5,6	2,2	2,9	279
Arequipa	99,7	58,7	1,4	76,7	8,1	77,1	0,2	11,8	3,8	1,3	732
Ayacucho	97,0	94,7	2,5	55,5	3,0	45,0	2,7	7,1	3,0	2,0	469
Cajamarca	93,5	86,6	1,4	42,9	3,2	46,9	7,6	5,3	1,1	1,0	710
Cusco	95,6	90,9	2,6	65,3	4,0	52,9	3,7	10,4	3,2	3,0	728
Huancavelica	98,0	97,3	0,0	39,2	2,6	41,5	1,3	4,4	1,6	1,2	260
Huánuco	95,5	86,8	0,3	51,1	2,8	59,1	10,3	7,8	1,6	1,0	451
Ica	99,7	76,7	1,1	86,2	5,6	66,0	2,2	7,9	3,0	2,2	532
Junín	98,9	89,2	2,8	85,5	7,6	73,6	2,6	9,8	4,1	7,3	818
La Libertad	97,8	77,5	0,6	69,5	1,8	65,2	3,3	8,7	1,3	1,2	816
Lambayeque	99,6	72,3	1,3	80,6	4,8	68,4	0,0	8,6	1,7	2,3	782
Lima	99,7	69,1	4,4	91,8	12,9	75,8	0,4	14,1	4,8	3,6	6 103
Loreto	98,2	88,6	1,5	58,8	9,1	58,3	3,3	2,8	3,5	1,7	554
Madre de Dios	98,5	84,5	1,1	85,4	2,7	68,2	1,2	10,8	3,9	4,1	107
Moquegua	98,7	92,1	2,3	81,9	4,0	67,0	0,9	12,2	3,6	4,8	99
Pasco	98,7	96,2	1,8	70,2	1,6	64,9	0,4	9,3	3,7	1,3	157
Piura	99,0	78,7	2,3	84,3	8,1	60,6	3,2	7,6	3,6	1,9	1 003
Puno	98,0	88,3	3,1	51,7	1,8	46,5	2,5	5,1	2,9	0,9	720
San Martín	99,2	91,8	4,1	74,5	4,4	65,5	1,5	6,6	2,7	3,0	509
Tacna	99,6	89,0	2,4	79,1	4,5	67,2	0,8	11,6	3,3	1,9	211
Tumbes	99,9	92,3	2,7	83,6	4,4	69,2	0,0	8,6	1,3	0,9	145
Ucayali	99,6	93,5	0,6	73,2	4,2	68,9	1,7	3,9	2,5	1,9	283
Total 2011	98,7	79,2	2,8	76,6	7,6	66,1	2,0	9,9	3,4	2,6	17 428
Total 2000	97,5	65,1	3,4	58,2	5,8	53,1	10,9	5,7	2,1	0,9	17 800

1/ Conocimiento para Planificación Familiar o para prevención de enfermedades.

2/ Para las usuarias actuales se incluye como fuente el último sitio donde obtuvo el condón.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Uso de condón según tipo de compañero (Cuadros 11.10 A y 11.10B; Gráfico 11.4)

- El uso de condón entre las mujeres que tuvieron relaciones sexuales, en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista, de acuerdo con el tipo de compañero, muestra los siguientes porcentajes: un 11,1 por ciento usó condón con su esposo o compañero, en el año 2000 fue 6,6 por ciento; el 31,0 por ciento los usó con un compañero con el cual no vive, en el año 2000 fue 17,9 por ciento; y, un 14,9 por ciento usó condón con cualquier compañero, en el año 2000 fue 8,0 por ciento. Es decir, hubo un incremento en todos los casos, y que el uso es mayor con parejas que no viven con ellas.
- El uso de condón con compañero con el cual no vive fue mayor entre las mujeres de 20 a 24 años de edad (38,3 por ciento), con educación superior (37,4 por ciento), solteras que han tenido relaciones sexuales (36,7 por ciento) y, las del quinto quintil de riqueza (36,2 por ciento). Por área de residencia fue más alta en la urbana (32,4 por ciento) y, por región natural en Lima Metropolitana (35,0 por ciento).
- El uso de condón con cualquier compañero, ocurrió en mayor porcentaje en mujeres solteras que han tenido relaciones sexuales (36,7 por ciento), en mujeres con educación superior (24,8 por ciento) y, del quinto quintil de riqueza (24,1 por ciento). Por área de residencia, fue en la urbana (18,4 por ciento) y, por región natural, en Lima Metropolitana (23,0 por ciento).
- Los datos encontrados en el año 2011 muestran que el uso de condón, cuya validez como método de protección de ITS y VIH está por demás comprobado, es mayor con parejas que no viven con las mujeres entrevistadas y que el conocimiento y acceso a estos, aumenta en tanto mayor sea el nivel educativo y las condiciones socioeconómicas en las que viven.

CUADRO N° 11.10A

PERÚ: USO DEL CONDÓN POR TIPO DE COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011

(Porcentaje)

Característica seleccionada	Usó condón con esposo o compañero		Usó con compañero con quien no vive		Usó condón con cualquier compañero	
	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres
Edad						
15-19	8,6	445	32,6	528	21,6	965
20-24	11,7	1 419	38,3	889	21,8	2302
25-29	13,5	2 145	32,2	579	17,5	2714
30-39	11,8	4 781	28,4	700	13,9	5468
40-49	8,9	3 876	13,2	354	9,2	4216
15-24	11,0	1 863	36,1	1417	21,7	3267
Estado conyugal						
Soltera ha tenido RS	*	0	36,7	2100	36,7	2100
Casada o Conviviente	11,0	12404	19,2	60	11,0	12434
Divorciada/Separada/Viuda	14,7	260	18,2	889	17,6	1132
Nivel de educación						
Sin educación	1,5	454	*	18	1,7	472
Primaria	4,8	3 815	10,7	236	5,2	4041
Secundaria	12,1	5 302	27,0	1227	14,9	6496
Superior	18,4	3 093	37,4	1568	24,8	4657
Quintil de riqueza						
Quintil inferior	3,1	2 354	11,5	168	3,6	2516
Segundo quintil	7,6	2 762	19,7	383	9,1	3135
Quintil intermedio	12,1	2 825	30,9	617	15,4	3429
Cuarto quintil	14,8	2 512	33,4	824	19,4	3321
Quintil superior	18,3	2 211	36,2	1057	24,1	3265
Total 2011	11,1	12 665	31,0	3049	14,9	15 666
Total 2000	6,6	15 466	17,9	2213	8,0	17 640

Nota: Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*) y las de 25-49 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).


CUADRO N° 11.10A
PERÚ: USO DEL CONDÓN POR TIPO DE COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN
ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2011
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Usó condón con esposo o compañero		Usó con compañero con quien no vive		Usó condón con cualquier compañero	
	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres
Área de residencia						
Urbana	14,0	8 769	32,4	2 730	18,4	11 456
Rural	4,4	3 896	18,2	319	5,5	4 209
Región natural						
Lima Metropolitana	18,2	3 369	35,0	1 349	23,0	4 703
Resto Costa	9,8	2 994	26,5	733	13,1	3 710
Sierra	8,7	4 536	30,8	601	11,3	5 136
Selva	5,8	1 765	25,2	366	8,9	2 117
Departamento						
Amazonas	5,8	194	18,1	24	7,2	217
Áncash	6,3	559	26,4	107	9,5	666
Apurímac	5,8	233	30,8	27	8,4	260
Arequipa	13,9	566	36,2	102	17,3	668
Ayacucho	9,1	398	22,2	53	10,6	452
Cajamarca	5,9	635	(20,3)	47	6,9	683
Cusco	10,0	600	40,2	96	14,2	696
Huancavelica	4,4	249	(26,0)	20	6,0	269
Huánuco	8,6	350	19,8	65	10,4	415
Ica	8,9	361	25,5	103	12,5	464
Junín	12,2	621	32,4	121	15,4	739
La Libertad	9,7	631	19,0	136	11,3	767
Lambayeque	8,4	543	25,2	139	11,8	682
Lima	17,3	3 788	35,3	1 434	22,3	5 198
Loreto	3,3	418	25,5	103	7,1	513
Madre de Dios	11,4	79	34,8	20	15,9	99
Moquegua	17,2	77	20,1	16	17,4	92
Pasco	11,1	122	32,6	21	14,2	143
Piura	9,0	768	25,9	168	12,0	932
Puno	6,6	629	(34,8)	45	8,5	674
San Martín	5,6	379	30,5	87	10,2	464
Tacna	13,6	135	30,4	44	17,8	178
Tumbes	10,1	118	18,1	15	10,9	132
Ucayali	3,6	209	18,6	56	6,8	265
Total 2011	11,1	12 665	31,0	3 049	14,9	15 666
Total 2000	6,6	15 466	17,9	2 213	8,0	17 640

Nota: Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*) y las de 25-49 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

GRÁFICO Nº 11.7
PERÚ: USO DE CONDÓN POR TIPO DE COMPAÑERO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011
(Porcentaje)



Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

