

DATOS BÁSICOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

INDICADORES	2000	2011
Población de la muestra		
Mujeres de 15 a 49 años de edad	27 843	22 517
Mujeres de 15 a 49 años de edad en el área urbana	19 453	16 802
Mujeres de 15 a 49 años de edad en el área rural	8 390	5 715
Niñas y niños nacidos en los últimos cinco años	12 222	8 426
Niñas y niños nacidos en los últimos cinco años en el área urbana	6 641	5 506
Niñas y niños nacidos en los últimos cinco años en el área rural	5 582	2 920
Sobrevivientes menores de cinco años de edad	11 754	8 276
Sobrevivientes menores de cinco años de edad en el área urbana	6 463	5 439
Sobrevivientes menores de cinco años de edad en el área rural	5 291	2 837
Niñas y niños vivos de 12 a 23 meses de edad	2 366	1 612
Niñas y niños vivos de 24 a 35 meses de edad	2 313	1 831
Características básicas		
Porcentaje de viviendas con agua potable 1/	72,3	77,1
Porcentaje de viviendas con agua potable en el área urbana 1/	87,7	82,6
Porcentaje de viviendas con agua potable en el área rural 1/	45,6	64,7
Porcentaje de viviendas con servicio de desagüe 2/	51,1	58,4
Porcentaje de viviendas con servicio de desagüe en el área urbana 2/	76,0	79,0
Porcentaje de viviendas con servicio de desagüe en el área rural 2/	8,0	12,5
Porcentaje de mujeres en edad fértil con secundaria o más	66,3	75,2
Porcentaje de mujeres en edad fértil con secundaria o más en el área urbana	80,9	86,2
Porcentaje de mujeres en edad fértil con secundaria o más en el área rural	32,1	42,5
Porcentaje de mujeres en edad fértil con algún seguro de salud	28,6	59,5
Porcentaje de mujeres en edad fértil con algún seguro de salud en el área urbana	34,8	53,7
Porcentaje de mujeres en edad fértil con algún seguro de salud en el área rural	14,2	76,3
Porcentaje de mujeres en edad fértil con SIS	nd	33,8
Porcentaje de mujeres en edad fértil con SIS en el área urbana	nd	21,2
Porcentaje de mujeres en edad fértil con SIS en el área rural	nd	70,8
Matrimonio y otros determinantes de la fecundidad		
Porcentaje de mujeres actualmente unidas	56,1	56,3
Porcentaje de mujeres actualmente unidas en el área urbana	51,4	52,2
Porcentaje de mujeres actualmente unidas en el área rural	67,1	68,3
Porcentaje que ha estado unida alguna vez	64,1	67,0
Porcentaje que ha estado unida alguna vez en el área urbana	60,2	64,1
Porcentaje que ha estado unida alguna vez en el área rural	73,3	75,4

INDICADORES	2000	2011
Para mujeres de 25-49 años de edad:		
Edad mediana a la primera unión	21,4	21,6
Edad mediana a la primera unión en el área urbana	22,5	22,6
Edad mediana a la primera unión en el área rural	19,6	19,5
Edad mediana al primer nacimiento	21,9	21,9
Edad mediana al primer nacimiento en el área urbana	22,8	22,9
Edad mediana al primer nacimiento en el área rural	20,3	20,0
Duración media de la amenorrea postparto (en meses)	11,2	9,3
Duración media de la abstinencia postparto (en meses)	6,1	4,2
Fecundidad		
Tasa Global de Fecundidad 3/	2,9	2,6
Tasa Global de Fecundidad en el área urbana	2,2	2,3
Tasa Global de Fecundidad en el área rural	4,3	3,5
Número medio de niñas y niños nacidos vivos de mujeres 40 a 49 años de edad	4,4	3,5
Número medio de niñas y niños nacidos vivos de mujeres 40 a 49 años de edad en el área urbana	3,6	3,0
Número medio de niñas y niños nacidos vivos de mujeres 40 a 49 años de edad en el área rural	6,3	5,0
Preferencias reproductivas		
Porcentaje de mujeres actualmente unidas:		
Que no desea tener más hijas e hijos (incluyendo mujeres esterilizadas)	67,3	62,6
Que desea postergar el nacimiento siguiente dos años o más	19,4	22,4
Número medio ideal de hijas e hijos para las mujeres de 15 a 49 años de edad	2,4	2,3
Número medio ideal de hijas e hijos para las mujeres de 15 a 49 años de edad en el área urbana	2,3	2,3
Número medio ideal de hijas e hijos para las mujeres de 15 a 49 años de edad en el área rural	2,5	2,4
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos por mujeres en edad fértil (MEF)		
Porcentaje de mujeres que conoce algún método de planificación familiar	97,9	99,5
Porcentaje de mujeres actualmente unidas:		
Que conoce algún método moderno	98,4	99,7
Que conoce algún método moderno en el área urbana	99,8	nd
Que conoce algún método moderno en el área rural	95,9	nd
Que actualmente usa algún método	68,9	75,4
Que actualmente usa algún método en el área urbana	73,0	75,9
Que actualmente usa algún método en el área rural	61,5	74,2
Que actualmente usa un método moderno	50,4	51,1
Que actualmente usa un método moderno en el área urbana	56,1	54,2
Que actualmente usa un método moderno en el área rural	40,3	44,1
Que actualmente usa un método tradicional	18,5	24,3
Que actualmente usa un método tradicional en el área urbana	16,9	21,7
Que actualmente usa un método tradicional en el área rural	21,2	30,1
Proporción de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar	12,4	7,2
Proporción de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar en el área urbana	9,1	6,6
Proporción de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar en el área rural	18,4	8,7

INDICADORES	2000	2011
Atención materna		
Porcentaje de últimos nacimientos cuyas madres recibieron: 4/		
Atención de un profesional de salud calificado (médico, obstetrix y enfermera) durante el embarazo (atención prenatal)	82,5	95,3
Atención de un profesional de salud calificado (médico, obstetrix y enfermera) durante el embarazo (atención prenatal) en el área urbana	92,2	98,9
Atención de un profesional de salud calificado (médico, obstetrix y enfermera) durante el embarazo (atención prenatal) en el área rural	69,0	88,1
Atención del parto en un establecimiento de salud	57,9	85,1
Atención del parto en un establecimiento de salud en el área urbana	82,4	95,2
Atención del parto en un establecimiento de salud en el área rural	23,8	64,2
Atención de un profesional de salud calificado (médico, obstetrix y enfermera) durante el parto	57,5	85,1
Atención de un profesional de salud calificado (médico, obstetrix y enfermera) durante el parto en el área urbana	84,6	96,0
Atención de un profesional de salud calificado (médico, obstetrix y enfermera) durante el parto en el área rural	25,3	64,4
Porcentaje de nacimientos por cesárea	12,7	22,9
Porcentaje de nacimientos por cesárea en el área urbana	20,2	30,7
Porcentaje de nacimientos por cesárea en el área rural	3,7	8,2
Porcentaje de control postnatal en los primeros dos días	nd	91,5
Porcentaje de control postnatal en los primeros dos días en el área urbana	nd	96,8
Porcentaje de control postnatal en los primeros dos días en el área rural	nd	80,8
Vacunación		
Porcentaje de niñas y niños de 18 a 29 meses de edad con tarjeta de vacunación	58,1	80,6
Porcentaje de niñas y niños de 18 a 29 meses de edad con tarjeta de vacunación en el área urbana	63,1	81,6
Porcentaje de niñas y niños de 18 a 29 meses de edad con tarjeta de vacunación en el área rural	51,8	78,7
Porcentaje de niñas y niños de 18 a 29 meses de edad que han recibido: 5/		
BCG	96,2	94,8
BCG en el área urbana	98,0	97,0
BCG en el área rural	93,9	90,5
DPT (las tres dosis)	84,7	81,4
DPT (las tres dosis) en el área urbana	89,4	83,3
DPT (las tres dosis) en el área rural	78,8	77,7
Polio (las tres dosis)	76,4	84,9
Polio (las tres dosis) en el área urbana	80,4	86,0
Polio (las tres dosis) en el área rural	71,4	82,8
Antisarampionosa	84,4	88,3
Antisarampionosa en el área urbana	86,1	88,6
Antisarampionosa en el área rural	82,2	87,7
Todas las vacunas 8/	66,3	71,0
Todas las vacunas en el área urbana 6/	71,6	73,8
Todas las vacunas en el área rural 6/	59,6	65,7
Prevalencia de enfermedades en menores de cinco años de edad		
Porcentaje de niñas y niños con diarrea 7/	15,4	13,9
Porcentaje de niñas y niños con diarrea en el área urbana 7/	13,6	13,3
Porcentaje de niñas y niños con diarrea en el área rural 7/	17,6	15,0
Porcentaje de niñas y niños con diarrea tratados con sobres de rehidratación oral SRO	21,9	29,8
Porcentaje de niñas y niños con diarrea tratados con sobres de rehidratación oral SRO en el área urbana	22,6	36,3
Porcentaje de niñas y niños con diarrea tratados con sobres de rehidratación oral SRO en el área rural	21,2	18,7
Porcentaje de niñas y niños enfermos con IRA	20,2	16,4
Porcentaje de niñas y niños enfermos con IRA en el área urbana	19,8	15,9
Porcentaje de niñas y niños enfermos con IRA en el área rural	20,6	17,6
Lactancia infantil y nutrición en la niñez		
Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón OMS)	31,0	19,5
Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón OMS) en el área urbana	17,8	10,1
Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón OMS) en el área rural	47,1	37,0
Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón NCHS)	25,4	15,2
Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón NCHS) en el área urbana	13,4	7,4
Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón NCHS) en el área rural	40,2	30,0
Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad con anemia	49,6	30,7
Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad con anemia en el área urbana	46,7	26,5
Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad con anemia en el área rural	53,5	38,6
Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad que recibió suplementos de hierro en los últimos siete días	nd	13,6
Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad que recibió suplementos de hierro en los últimos siete días en el área urbana	nd	11,6
Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad que recibió suplementos de hierro en los últimos siete días en el área rural	nd	17,5

INDICADORES	2000	2011
Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad que recibió suplementos de vitamina A los últimos seis meses	nd	3,9
Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad que recibió suplementos de vitamina A los últimos seis meses en el área urbana	nd	1,7
Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad que recibió suplementos de vitamina A los últimos seis meses en el área rural	nd	8,1
Porcentaje de niñas y niños nacidos con bajo peso al nacer (menos de 2,5 kg.)	5,9	6,5
Porcentaje de niñas y niños nacidos con bajo peso al nacer (menos de 2,5 kg.) en el área urbana	6,3	6,0
Porcentaje de niñas y niños nacidos con bajo peso al nacer (menos de 2,5 kg.) en el área rural	5,5	7,3
Porcentaje de niñas y niños menores de seis meses de edad con lactancia exclusiva	68,6	70,6
Porcentaje de niñas y niños menores de cuatro meses de edad amamantados	98,9	99,3
Duración mediana de la lactancia (en meses) 8/	22,8	20,4
Nutrición de las mujeres en edad fértil		
Porcentaje de mujeres que recibieron suplemento de hierro en el último nacimiento 9/	60,2	86,5
Porcentaje de mujeres que recibieron suplemento de hierro en el último nacimiento en el área urbana 9/	65,4	88,5
Porcentaje de mujeres que recibieron suplemento de hierro en el último nacimiento en el área rural 9/	51,2	82,4
Porcentaje de mujeres que tomó hierro por 90 días o más durante el embarazo	16,9	40,4
Porcentaje de mujeres que tomó hierro por 90 días o más durante el embarazo en el área urbana	23,0	45,0
Porcentaje de mujeres que tomó hierro por 90 días o más durante el embarazo en el área rural	9,2	30,8
Porcentaje de mujeres con anemia	31,6	17,4
Porcentaje de mujeres con anemia en el área urbana	29,2	16,8
Porcentaje de mujeres con anemia en el área rural	37,1	19,3
Porcentaje de madres con talla menor de 145 cms.	13,2	9,4
Porcentaje de madres con talla menor de 145 cms. en el área urbana	11,0	7,3
Porcentaje de madres con talla menor de 145 cms. en el área rural	18,1	15,3
Prevalencia de infecciones de transmisión sexual		
Porcentaje con una ITS	0,9	0,6
Porcentaje con una ITS en el área urbana	1,1	0,7
Porcentaje con una ITS en el área rural	0,4	0,5
Porcentaje con flujo vaginal	22,9	12,6
Porcentaje con flujo vaginal en el área urbana	23,8	12,7
Porcentaje con flujo vaginal en el área rural	20,9	12,3
Úlceras llagas genitales	3,4	1,7
Úlceras llagas genitales en el área urbana	3,8	1,7
Úlceras llagas genitales en el área rural	2,5	1,4
Violencia intrafamiliar		
Mujeres alguna vez unidas:		
Porcentaje que experimentaron violencia física por el esposo o compañero	41,2	38,0
Porcentaje que experimentaron violencia física por el esposo o compañero en el área urbana	42,0	38,9
Porcentaje que experimentaron violencia física por el esposo o compañero en el área rural	39,6	36,0
Porcentaje que soportó violencia sexual	nd	9,3
Porcentaje que soportó violencia sexual en el área urbana	nd	9,4
Porcentaje que soportó violencia sexual en el área rural	nd	9,1
Porcentaje que fueron agredidas alguna vez bajo los efectos del alcohol por el esposo o compañero	nd	8,1
Porcentaje que fueron agredidas alguna vez bajo los efectos del alcohol por el esposo o compañero en el área urbana	nd	8,2
Porcentaje que fueron agredidas alguna vez bajo los efectos del alcohol por el esposo o compañero en el área rural	nd	7,7
Porcentaje de mujeres de 15-49 años de edad que fueron maltratadas por otras personas	27,9	16,3
Porcentaje de mujeres de 15-49 años de edad que fueron maltratadas por otras personas en el área urbana	30,3	18,1
Porcentaje de mujeres de 15-49 años de edad que fueron maltratadas por otras personas en el área rural	23,2	11,7

1/ Comprende agua potable dentro, fuera de la vivienda y pilón/grifo público.

2/ Servicio con desagüe comprende el servicio higiénico conectado a red pública dentro y fuera de la vivienda.

3/ Tomando como base los nacimientos ocurridos durante los tres años anteriores a la encuesta.

4/ Tomando como base los nacimientos ocurridos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta.

5/ Información obtenida del carnet de vacunación y de la información proporcionada por la madre.

6/ Incluye BCG, tres dosis de polio, tres dosis de DPT y antiserampionosa.

7/ Niñas y niños menores de cinco años de edad cuyas madres declararon que aquéllos tuvieron diarrea durante las dos semanas anteriores a la encuesta.

8/ Calculado por el método de Prevalencia/ Incidencia.

9/ Para el año 2000, el indicador se refiere únicamente a las mujeres que recibieron atención prenatal.

nd = No disponible.