

CONOCIMIENTO DE VIH E ITS

En la mayoría de los países en desarrollo, las infecciones de transmisión sexual (ITS) ocupan el segundo lugar entre las causas de enfermedad de las mujeres en edad reproductiva, después de aquellas relacionadas con la maternidad. La prevención y el tratamiento de las ITS constituyen mecanismos de intervención en la perspectiva de mejorar la salud pública, dado el grado de morbilidad y mortalidad que causan, asimismo evitar la transmisión del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

El comportamiento del VIH y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en el Perú es el de una epidemia concentrada, así desde el primer caso diagnosticado de SIDA en el Perú en el año 1983 hasta el 31 de diciembre de 2012, se han reportado 29 mil 314 casos de SIDA y 48 mil 527 casos notificados de VIH¹ pero se estima que más de 100 mil personas estarían viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana hasta el año 2040. La magnitud del problema, la rápida propagación del VIH/SIDA, la no existencia de cura para la enfermedad y la relación entre ITS y VIH confirman la importancia de monitorear el conocimiento de la población sobre la transmisión, prevención y percepción de los riesgos.

El cuestionario individual de la ENDES 2012 sigue incluyendo una sección, con preguntas previamente evaluadas y mejoradas, para indagar sobre el conocimiento general de las mujeres acerca de las infecciones transmitidas sexualmente: conocimiento de las distintas infecciones, si han adquirido infecciones en los 12 meses anteriores a la entrevista y, en caso positivo, lugar y persona donde buscó tratamiento o consejo y comunicación con el compañero sexual. Con relación al VIH/SIDA, se indagó sobre el lugar donde una persona puede hacerse la prueba para saber si tiene el virus que causa la enfermedad, qué debe hacerse para evitar contraer el VIH, si una persona puede ser VIH-positiva aunque parezca saludable, y si cree que el VIH puede ser transmitido de la madre a la hija o hijo y en qué momento.

Igualmente se les pidió a las mujeres opinar sobre los derechos de las personas con VIH-positivo para participar en el mercado laboral o llevar una vida en comunidad. También se hicieron preguntas sobre la conducta sexual en los últimos 12 meses (número y tipo de parejas sexuales y uso del condón).

11.1 CONOCIMIENTO DE VIH/SIDA Y FORMAS DE EVITAR

A las mujeres entrevistadas se les preguntó si habían oído hablar de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana y del SIDA. A quienes respondieron afirmativamente, se indagó si había algo que una persona pueda hacer para evitar infectarse con el VIH. El conocimiento de formas programáticas y específicas de evitar el virus, la percepción de la entrevistada sobre el riesgo de infección por el VIH y los aspectos sociales de la prevención y mitigación, se presenta en los cuadros 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 y 11.6.

Conocimiento de VIH/SIDA (Cuadros 11.1 y 11.2)

- Del total de mujeres entrevistadas en la ENDES 2012, el 96,6 por ciento conoce o ha oído hablar del VIH/SIDA lo que implica una mejora de 2,4 puntos porcentuales, en relación con el año 2009 donde el porcentaje era de 94,2 por ciento. Este resultado corrobora que el acceso a la información ha mejorado con el tiempo y ha permitido que más mujeres estén informadas y tengan conocimiento sobre el tema.
- En el año 2012, el 6,9 por ciento de mujeres entrevistadas manifestó que desconocía alguna forma de prevención de las dos formas consideradas (menor número de parejas sexuales o uso del condón). En el año 2009, este porcentaje fue 5,7 por ciento.

¹/ Ministerio de Salud: Dirección General de Epidemiología / Boletín Mensual Diciembre 2012.

- Con respecto a las mujeres que desconocen los aspectos relacionados con el VIH/SIDA, se observa que según características seleccionadas, los menores porcentajes se ubicaron en aquellas mujeres con educación superior y con educación secundaria (0,1 y 0,9 por ciento, respectivamente). De igual manera en las que pertenecen a los quintiles de riqueza superior y cuarto (0,2 y 0,4 por ciento, respectivamente). En cambio, las mujeres entrevistadas que no tienen educación (27,1 por ciento) y, las que pertenecen al quintil inferior de riqueza (15,7 por ciento) constituyen el mayor porcentaje de mujeres que desconoce sobre el VIH/SIDA.
- Según ámbito geográfico, Cajamarca fue el departamento donde se registró el mayor porcentaje de mujeres que respondieron desconocimiento sobre el VIH/SIDA (12,0 por ciento), seguido por Huancavelica (11,2 por ciento) y La Libertad (9,7 por ciento); por región natural, la Sierra concentra a las mujeres que tienen menor conocimiento en este tema (8,1 por ciento); y por área de residencia, este porcentaje fue mayor en el área rural (10,8 por ciento).
- Sobre el conocimiento de las formas específicas de evitar el VIH, el 83,0 por ciento de las mujeres respondió “limitar el número de parejas sexuales o mutua fidelidad”; con relación al año 2009 se aprecia un ligero incremento de 0,1 puntos porcentuales. Asimismo, el conocimiento sobre el uso del condón creció al pasar de 74,2 por ciento, en el año 2009 a 75,1 por ciento en el 2012.
- Se observan mejoras globales en el nivel de conocimiento del VIH/SIDA y sus formas de prevención, principalmente en Lima Metropolitana, en mujeres con mayor nivel educativo, residentes del área urbana y aquellas ubicadas en el quintil superior de riqueza. Esta situación revela la existencia de brechas que aún deben ser subsanadas a nivel nacional.

CUADRO N° 11.1
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA Y ESPECÍFICAS DE EVITAR EL VIH, SEGÚN
CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2012
(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	No conoce VIH/SIDA	Conocimiento de dos formas de importancia programática de evitar el VIH			Conocimiento de dos formas específicas		Número de mujeres
			Ninguna de las dos formas 1/	Una forma	Dos formas	Usar condones	Limitar el número de parejas sexuales 2/	
Edad								
15-19	100,0	3,4	6,9	27,4	62,4	69,8	82,3	4 423
20-24	100,0	3,1	5,9	19,9	71,2	77,4	84,9	3 517
25-29	100,0	2,7	6,1	19,3	71,9	78,5	84,5	3 387
30-39	100,0	3,3	6,5	19,8	70,5	77,3	83,4	6 753
40-49	100,0	4,4	8,3	20,2	67,1	73,4	81,0	5 807
15-24	100,0	3,2	6,4	24,1	66,3	73,2	83,4	7 941
Estado conyugal								
Soltera	100,0	3,1	6,2	23,8	66,9	73,5	84,1	7 839
Ha tenido RS	100,0	2,1	5,1	18,7	74,1	80,9	86,0	3 380
Nunca ha tenido RS	100,0	3,9	7,0	27,7	61,4	67,8	82,7	4 460
Casada o Conviviente	100,0	3,9	7,4	19,7	68,9	75,8	81,8	13 624
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	2,0	5,9	21,5	70,6	77,0	85,8	2 425
Nivel de educación								
Sin educación	100,0	27,1	22,3	21,9	28,7	34,9	44,4	579
Primaria	100,0	10,5	13,0	23,9	52,6	61,4	67,7	5 352
Secundaria	100,0	0,9	5,4	22,3	71,4	78,4	86,7	11 199
Superior	100,0	0,1	3,0	17,4	79,5	84,2	92,2	6 757
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	100,0	15,7	14,6	22,6	47,2	54,5	62,5	3 628
Segundo quintil	100,0	3,7	8,2	21,6	66,5	73,7	80,9	4 479
Quintil intermedio	100,0	1,1	5,3	22,4	71,2	79,2	85,6	5 309
Cuarto quintil	100,0	0,4	5,6	21,4	72,6	78,5	88,1	5 231
Quintil superior	100,0	0,2	3,2	18,6	77,9	83,2	91,2	5 243
Total 2012	100,0	3,4	6,9	21,2	68,4	75,1	83,0	23 888
Total 2009	100,0	5,8	5,7	19,9	68,6	74,2	82,9	24 212

Nota: Las dos formas de importancia programática son: usar condones y limitar el número de parejas sexuales. Las respuestas provienen tanto de respuestas espontáneas como sondeos.

1/ Mujeres que no han oído hablar de VIH/SIDA o que no conocen las formas de importancia programática.

2/ Incluye ser mutuamente fiel.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO N° 11.2
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA Y ESPECÍFICAS
DE EVITAR EL VIH, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012

(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	No conoce VIH/SIDA	Conocimiento de dos formas de importancia programática de evitar el VIH			Conocimiento de dos formas específicas		Número de mujeres
			Ninguna de las dos formas 1/	Una forma	Dos formas	Usar condones	Limitar el número de parejas sexuales 2/	
Área de residencia								
Urbana	100,0	1,0	5,0	20,9	73,1	79,6	87,5	17 866
Rural	100,0	10,8	12,3	22,2	54,6	62,0	69,5	6 022
Región natural								
Lima Metropolitana	100,0	0,3	4,9	22,1	72,8	79,4	88,3	7 508
Resto Costa	100,0	1,9	5,8	20,8	71,5	77,5	86,4	5 715
Sierra	100,0	8,1	9,8	21,8	60,3	67,7	74,7	7 742
Selva	100,0	2,4	6,4	18,3	72,9	79,3	84,8	2 923
Departamento								
Amazonas	100,0	5,5	12,9	23,5	58,1	68,5	71,2	330
Áncash	100,0	3,4	6,3	20,3	70,0	74,6	85,6	1 090
Apurímac	100,0	5,9	7,2	21,0	65,9	69,9	83,0	360
Arequipa	100,0	3,4	6,0	20,5	70,2	78,5	82,2	906
Ayacucho	100,0	7,5	9,7	33,5	49,4	58,0	74,2	683
Cajamarca	100,0	12,0	13,5	25,0	49,6	60,7	63,4	1 146
Cusco	100,0	6,2	8,5	14,3	70,9	74,8	81,3	954
Huancavelica	100,0	11,2	7,5	18,0	63,3	68,8	75,7	363
Huánuco	100,0	3,5	15,3	24,0	57,3	68,0	70,5	685
Ica	100,0	0,3	3,7	19,7	76,3	80,1	92,3	631
Junín	100,0	4,1	3,6	18,6	73,7	80,7	85,4	1 010
La Libertad	100,0	9,7	9,9	16,6	63,8	70,6	73,6	1 357
Lambayeque	100,0	2,7	6,4	23,2	67,7	72,7	85,8	955
Lima 3/	100,0	0,7	5,0	22,2	72,1	78,9	87,5	8 348
Loreto	100,0	1,8	5,4	19,2	73,6	78,3	88,0	731
Madre de Dios	100,0	1,2	4,1	19,3	75,3	82,9	87,2	116
Moquegua	100,0	2,3	9,8	22,8	65,0	74,8	78,1	135
Pasco	100,0	5,5	5,2	18,5	70,7	77,6	82,4	223
Piura	100,0	3,1	5,2	22,7	69,0	75,5	85,2	1 447
Puno	100,0	5,2	13,3	23,7	57,8	65,7	73,6	959
San Martín	100,0	0,7	3,7	13,6	82,0	85,8	91,7	653
Tacna	100,0	0,6	6,4	18,2	74,9	79,7	88,3	291
Tumbes	100,0	0,0	4,1	28,3	67,7	74,2	89,4	190
Ucayali	100,0	3,9	5,7	12,0	78,4	84,6	84,3	324
Total 2012	100,0	3,4	6,9	21,2	68,4	75,1	83,0	23 888
Total 2009	100,0	5,8	5,7	19,9	68,6	74,2	82,9	24 212

Nota: Las dos formas de importancia programática son: usar condones y limitar el número de parejas sexuales. Las respuestas provienen tanto de respuestas espontáneas como sondeos.


1/ Mujeres que no han oído hablar de VIH/SIDA o que no conocen las formas de importancia programática.

2/ Incluye ser mutuamente fiel.

3/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

GRÁFICO N° 11.1
 PERÚ: CONOCIMIENTO DE FORMAS ESPECÍFICAS DE EVITAR EL VIH, SEGÚN
 CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2012
 (Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

GRÁFICO N° 11.2
 PERÚ: MUJERES CON CONOCIMIENTO DE DOS FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA DE
 EVITAR EL VIH, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA, 2009 Y 2012
 (Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

11.2 CONOCIMIENTO DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL VIH

A las mujeres entrevistadas se les hizo una serie de preguntas sobre asuntos relacionados con el VIH con el propósito de evaluar el grado de conocimiento sobre el tema. Específicamente se les preguntó si una persona que parece saludable puede ser VIH-positiva y si puede ser transmitido de la madre a la hija o hijo y en qué momento. Los resultados obtenidos se presentan en los Cuadros 11.3 y 11.4.

Apectos relacionados con el VIH (Cuadros 11.3 y 11.4)

- El 75,5 por ciento de mujeres entrevistadas en la ENDES 2012 manifestó que una persona que parece saludable pueda tener el VIH, incrementándose en 0,9 puntos porcentuales con respecto al año 2009 (74,6 por ciento). Se advierte que el porcentaje de mujeres que consideraron una posición contraria ha aumentado 2,6 puntos porcentuales, lo que significaría un retroceso en el nivel de conocimiento y percepción que tienen las mujeres sobre el tema. Por otro lado, se constata una mejora entre las mujeres que respondieron “No sabe o no tiene información”, al registrar un porcentaje menor en el año 2012 (9,4 por ciento) respecto al año 2009 (12,9 por ciento). En efecto en términos comparativos disminuyó en 3,5 puntos porcentuales.
- Las mujeres que respondieron en mayor porcentaje acerca de que una persona que parece saludable pueda tener el VIH, fueron las que alcanzaron educación superior (91,8 por ciento), de los quintiles de riqueza superior y cuarto (90,1 y 83,2 por ciento, respectivamente) y, solteras que han tenido relaciones sexuales (82,2 por ciento). Por área de residencia, fue mayor en la urbana (82,4 por ciento), por región natural en Lima Metropolitana (84,4 por ciento) y Resto Costa (79,2 por ciento), mientras que por departamento fueron San Martín (89,3 por ciento), Tumbes (85,7 por ciento), Tacna (84,6 por ciento) y Madre de Dios (84,0 por ciento).
- Dado que el VIH registra un largo periodo asintomático, lo anterior es muy importante, ya que el desconocer que una persona aparentemente saludable pueda transmitir este virus permitiría que muchas mujeres incurran en contactos sexuales de riesgo.
- También es muy preocupante los datos obtenidos respecto a la transmisión vertical (madre a hija o hijo) del VIH. Al respecto, se constató un importante incremento en el porcentaje de mujeres que refirieron que el virus no se puede transmitir en esta condición. El 21,0 por ciento de mujeres no consideraron esta posibilidad, significando una disminución de 8,9 puntos porcentuales respecto a la ENDES 2009 que fue 12,1 por ciento. A pesar de esta reducción, todavía se pone en inminente riesgo a la hija e hijo por nacer en el caso que su madre fuera portadora del VIH.
- Por otra parte, entre las mujeres que identifican las formas de transmisión del VIH de madre a hija o hijo, un 65,5 por ciento mencionó que puede ocurrir durante el embarazo o parto y un 37,6 por ciento con la lactancia, habiendo disminuido el grupo que no sabe el mecanismo de transmisión (de 9,6 por ciento en la ENDES 2009 a 3,4 por ciento en la ENDES 2012).
- Investigaciones especializadas, sobre el tema, enfatizan acerca de la importancia del control prenatal en esta etapa, ya que la identificación de una gestante con VIH permitiría que reciba el tratamiento profiláctico correspondiente (antirretrovirales, cesárea electiva y lactancia artificial) para disminuir el riesgo en la hija o hijo.

CUADRO N° 11.3
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL VIH Y TRANSMISIÓN DEL VIH DE
LA MADRE A LA HIJA O HIJO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2012

(Porcentaje)

Característica seleccionada	Una persona que parece saludable puede tener el VIH			El VIH se puede transmitir de la madre a la hija o hijo			Número de mujeres	
	Si	No	No sabe / No conoce	No 1/	Durante el embarazo o parto	Durante la lactancia		No sabe 2/
Edad								
15-19	75,4	16,8	7,8	20,5	62,7	41,7	3,4	4 423
20-24	78,4	14,3	7,3	17,9	67,5	44,6	3,1	3 517
25-29	77,8	14,2	8,0	19,6	66,9	40,4	2,7	3 387
30-39	75,7	14,6	9,7	21,1	66,9	34,4	3,3	6 753
40-49	72,2	15,5	12,2	23,8	64,2	32,2	4,4	5 807
15-24	76,7	15,7	7,6	19,4	64,9	43,0	3,2	7 941
Estado conyugal								
Soltera	78,7	14,0	7,2	18,1	68,8	40,0	3,1	7 839
Ha tenido RS	82,2	12,3	5,6	15,7	73,1	40,2	2,1	3 380
No ha tenido RS	76,1	15,4	8,5	20,0	65,5	39,8	3,9	4 460
Casada o Conviviente	73,0	16,2	10,8	23,2	63,0	36,4	3,9	13 624
Divorciada/Separada/Viuda	79,2	12,5	8,2	17,9	69,4	36,3	2,0	2 425
Nivel de educación								
Sin educación	32,6	24,4	43,0	65,2	21,2	16,5	27,1	579
Primaria	54,0	24,4	21,7	43,4	39,7	28,4	10,5	5 352
Secundaria	78,2	15,5	6,3	16,6	68,4	39,5	0,9	11 199
Superior	91,8	6,4	1,7	6,6	85,0	43,4	0,1	6 757
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	47,3	26,5	26,2	47,2	33,3	30,7	15,7	3 628
Segundo quintil	69,4	20,0	10,6	26,2	56,7	36,9	3,7	4 479
Quintil intermedio	77,9	14,4	7,6	17,0	69,7	39,2	1,1	5 309
Cuarto quintil	83,2	11,8	5,0	12,7	75,4	41,1	0,4	5 231
Quintil superior	90,1	7,1	2,8	10,7	81,4	37,7	0,2	5 243
Total 2012	75,5	15,1	9,4	21,0	65,5	37,6	3,4	23 888
Total 2009	74,6	12,5	12,9	12,1	64,1	37,0	9,6	24 212

1/ Incluye las que respondieron no y no sabe acerca de la transmisión del VIH de la madre a la hija o hijo.

2/ No ha oído hablar de VIH/SIDA.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO N° 11.4
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL VIH Y TRANSMISIÓN DEL VIH
DE LA MADRE A LA HIJA O HIJO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Una persona que parece saludable puede tener el VIH			El VIH se puede transmitir de la madre a la hija o hijo				Número de mujeres
	Si	No	No sabe / No conoce	No 1/	Durante el embarazo o parto	Durante la lactancia	No sabe 2/	
Área de residencia								
Urbana	82,4	11,8	5,8	15,0	73,0	39,3	1,0	17 866
Rural	55,1	25,0	19,9	38,8	43,5	32,6	10,8	6 022
Región natural								
Lima Metropolitana	84,4	10,8	4,8	12,2	76,0	40,7	0,3	7 508
Resto Costa	79,2	12,3	8,5	20,5	68,2	36,8	1,9	5 715
Sierra	63,3	21,1	15,5	31,0	53,4	33,5	8,1	7 742
Selva	77,7	16,0	6,3	17,9	65,5	41,8	2,4	2 923
Departamento								
Amazonas	64,5	22,2	13,3	27,6	53,4	41,3	5,5	330
Áncash	75,5	14,7	9,7	20,4	65,4	35,0	3,4	1 090
Apurímac	57,1	29,3	13,6	20,5	49,0	53,2	5,9	360
Arequipa	82,0	11,7	6,3	17,8	71,7	24,7	3,4	906
Ayacucho	57,0	21,6	21,4	32,3	41,5	44,5	7,5	683
Cajamarca	59,0	24,8	16,2	37,7	48,3	34,4	12,0	1 146
Cusco	68,9	18,9	12,1	27,1	58,9	37,5	6,2	954
Huancavelica	52,3	30,4	17,3	38,8	43,9	35,8	11,2	363
Huánuco	59,1	32,1	8,8	26,9	59,0	34,0	3,5	685
Ica	82,3	11,1	6,6	13,0	76,4	40,7	0,3	631
Junín	75,9	15,7	8,4	14,1	73,0	41,8	4,1	1 010
La Libertad	66,4	10,2	23,4	42,6	48,9	24,4	9,7	1 357
Lambayeque	77,6	14,1	8,3	18,9	70,9	29,6	2,7	955
Lima 3/	83,2	11,1	5,7	13,4	75,3	39,9	0,7	8 348
Loreto	81,1	15,5	3,4	19,7	63,8	43,9	1,8	731
Madre de Dios	84,0	12,0	4,0	10,1	76,5	40,2	1,2	116
Moquegua	78,8	13,4	7,8	19,7	69,7	33,7	2,3	135
Pasco	69,4	20,0	10,5	16,2	69,6	36,8	5,5	223
Piura	74,5	15,3	10,2	22,2	62,9	42,5	3,1	1 447
Puno	60,6	26,1	13,3	40,1	42,2	27,5	5,2	959
San Martín	89,3	7,1	3,6	8,0	72,1	42,9	0,7	653
Tacna	84,6	10,2	5,3	16,9	71,4	41,0	0,6	291
Tumbes	85,7	12,7	1,5	14,1	68,4	51,3	0,0	190
Ucayali	79,2	11,8	9,0	23,3	63,7	38,4	3,9	324
Total 2012	75,5	15,1	9,4	21,0	65,5	37,6	3,4	23 888
Total 2009	74,6	12,5	12,9	12,1	64,1	37,0	9,6	24 212

1/ Incluye las que respondieron no y no sabe acerca de la transmisión del VIH de la madre a la hija o hijo.

2/ No ha oído hablar de VIH/SIDA.

3/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Aspectos sociales de la prevención del VIH (Cuadros 11.5 y 11.6)

- Del total de mujeres entrevistadas que conoce del VIH/SIDA, más de la mitad (58,0 por ciento) opinó que una maestra o maestro con VIH si puede seguir enseñando (incremento de 4,0 puntos porcentuales respecto a la ENDES 2009), representando un avance en este aspecto; hay más mujeres que piensan lo contrario, es decir, que no debe enseñar, y que representan un 35,4 por ciento (1,3 punto porcentual menos que en la ENDES 2009).
- Las opiniones sobre si la persona VIH-positiva podría ser despedida de su trabajo fueron, en comparación con la ENDES 2009, las siguientes: 20,7 por ciento opinó que si puede ser despedida(o) (disminuyó en 11,1 puntos porcentuales), y 72,7 por ciento manifestó lo contrario (se incrementó en 13,6 puntos porcentuales).
- Han aumentado los porcentajes sobre si las mujeres entrevistadas estarían dispuestas a cuidar en el hogar a un pariente con el VIH: sí lo harían, un 72,1 por ciento (69,4 por ciento en la ENDES 2009), y no lo harían, un 20,6 por ciento (20,2 por ciento en la ENDES 2009).
- La respuesta “No sabe” a cada una de las tres preguntas mencionadas también debe llamar la atención por su relevancia en las acciones que se debe tomar para el futuro. El 6,6 por ciento de mujeres no sabía si a una maestra (o) con VIH se le debe permitir o continuar impartiendo clases en la escuela, colegio o universidad; igualmente, un 6,6 por ciento no sabía si una persona VIH-positiva podría ser despedida de su trabajo; y un 7,2 por ciento no sabía si cuidaría en el hogar a un pariente que vive con el VIH.
- Se observa que la mayoría de mujeres que opinaron que a una maestra (o) con VIH no se le debe permitir o continuar impartiendo clases en la escuela, colegio o universidad se ubicaron en el quintil inferior de riqueza (59,8 por ciento), con educación primaria y sin educación (59,3 y 54,9 por ciento, respectivamente) y residentes en el área rural (57,8 por ciento). Este comportamiento también se observó en las mujeres que manifestaron que una persona VIH-positiva podría ser despedida de su trabajo.
- El mayor porcentaje de mujeres opinó que una persona que vive con el VIH no puede ser despedida del trabajo, especialmente entre las mujeres con educación superior (91,5 por ciento), del quintil superior y cuarto quintil de riqueza (89,6 y 85,2 por ciento, respectivamente. Por área de residencia las del área urbana (81,3 por ciento) y, por región natural de Lima Metropolitana (86,4 por ciento) Asimismo, entre aquellas que manifestaron estarían dispuestas a cuidar a un pariente VIH-positivo en el hogar.

CUADRO N° 11.5

PERÚ: MUJERES POR RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE CIERTOS ASPECTOS SOCIALES DE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL VIRUS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2012

(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Maestra/Maestro con VIH debe seguir enseñando			Persona VIH-positiva puede ser despedida del trabajo			Dispuesta a cuidar pariente con VIH en el hogar			Número de mujeres
	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	
Edad										
15-19	55,2	38,9	5,9	20,0	73,8	6,2	73,2	20,1	6,7	4 423
20-24	61,8	31,8	6,4	17,6	77,0	5,4	74,5	18,8	6,7	3 517
25-29	60,6	33,8	5,6	19,1	75,4	5,5	71,4	21,8	6,8	3 387
30-39	59,8	33,9	6,3	20,4	73,2	6,4	71,3	21,9	6,9	6 753
40-49	54,2	37,7	8,2	24,6	67,0	8,4	71,4	20,0	8,6	5 807
15-24	58,2	35,8	6,1	18,9	75,2	5,9	73,8	19,6	6,7	7 941
Estado conyugal										
Soltera	64,7	29,9	5,4	15,9	78,7	5,4	77,7	16,1	6,1	7 839
Ha tenido RS	70,6	24,9	4,5	14,2	81,9	3,9	80,0	14,9	5,1	3 380
Nunca ha tenido RS	60,2	33,7	6,1	17,2	76,3	6,6	76,0	17,0	6,9	4 460
Casada o Conviviente	53,4	39,1	7,6	23,8	68,7	7,5	68,5	23,6	7,9	13 624
Divorciada/Separada/Viuda	62,5	32,7	4,8	19,4	75,5	5,1	74,4	18,9	6,6	2 425
Nivel de educación										
Sin educación	13,7	54,9	31,4	37,5	29,8	32,7	40,5	29,9	29,6	579
Primaria	26,1	59,3	14,6	39,2	44,7	16,0	57,2	28,2	14,6	5 352
Secundaria	60,0	35,9	4,1	19,2	76,9	3,9	74,8	20,4	4,8	11 199
Superior	83,8	14,0	2,1	7,3	91,5	1,3	82,3	14,2	3,5	6 757
Quintil de riqueza										
Quintil inferior	20,5	59,8	19,6	40,7	38,4	20,9	49,2	32,0	18,8	3 628
Segundo quintil	42,1	51,1	6,8	31,5	61,0	7,5	68,7	24,3	7,0	4 479
Quintil intermedio	61,5	34,0	4,5	18,3	77,0	4,7	76,1	18,1	5,8	5 309
Cuarto quintil	71,8	25,0	3,2	12,6	85,2	2,2	79,7	16,4	4,0	5 231
Quintil superior	80,2	16,9	3,0	8,4	89,6	2,1	79,4	16,5	4,1	5 243
Total 2012	58,0	35,4	6,6	20,7	72,7	6,6	72,1	20,6	7,2	23 888
Total 2009	54,0	36,7	9,4	31,8	59,1	9,1	69,4	20,2	10,4	24 212

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO Nº 11.6

PERÚ: MUJERES POR RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE CIERTOS ASPECTOS SOCIALES DE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL VIRUS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012

(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Maestra/Maestro con VIH debe seguir enseñando			Persona VIH-positiva puede ser despedida del trabajo			Dispuesta a cuidar pariente con VIH en el hogar			Número de mujeres
	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	
Área de residencia										
Urbana	68,1	27,9	4,0	15,1	81,3	3,6	77,2	17,9	4,9	17 866
Rural	28,0	57,8	14,2	37,5	47,2	15,3	57,1	28,9	14,0	6 022
Región natural										
Lima Metropolitana	72,4	24,1	3,5	11,0	86,4	2,6	79,7	16,3	4,0	7 508
Resto Costa	64,2	30,4	5,4	16,0	79,1	4,9	72,0	20,4	7,6	5 715
Sierra	42,3	46,7	11,0	30,6	57,1	12,3	64,7	24,4	11,0	7 742
Selva	50,4	44,6	5,0	28,9	66,3	4,8	72,8	22,4	4,8	2 923
Departamento										
Amazonas	37,9	51,3	10,9	32,6	56,3	11,1	69,6	22,7	7,7	330
Áncash	53,0	40,4	6,6	30,6	63,5	5,9	75,8	18,6	5,6	1 090
Apurímac	28,3	64,4	7,3	48,9	43,1	8,0	54,9	38,2	7,0	360
Arequipa	69,9	24,9	5,2	12,9	82,0	5,1	73,9	20,9	5,2	906
Ayacucho	39,2	48,5	12,3	38,9	45,9	15,1	65,1	22,8	12,1	683
Cajamarca	35,5	51,4	13,2	28,4	56,7	14,9	62,1	23,0	14,9	1 146
Cusco	44,5	48,1	7,4	33,0	59,3	7,7	70,6	22,5	6,9	954
Huancavelica	28,6	57,0	14,4	35,9	49,8	14,3	62,6	24,0	13,4	363
Huánuco	39,3	53,3	7,4	39,7	52,7	7,6	64,2	29,6	6,3	685
Ica	66,8	28,8	4,4	10,3	87,2	2,6	81,8	13,8	4,4	631
Junín	55,3	38,1	6,6	21,0	73,1	5,9	77,8	15,9	6,2	1 010
La Libertad	57,0	26,5	16,5	13,9	68,7	17,4	48,3	30,1	21,7	1 357
Lambayeque	57,7	36,4	5,9	18,8	75,7	5,5	70,7	20,7	8,7	955
Lima 1/	71,2	25,0	3,8	11,6	85,5	2,9	78,5	16,9	4,6	8 348
Loreto	51,5	44,7	3,8	26,9	70,0	3,1	67,4	28,6	4,1	731
Madre de Dios	55,7	40,7	3,6	24,5	71,7	3,8	77,6	18,3	4,1	116
Moquegua	61,0	29,6	9,4	21,1	70,3	8,6	70,8	16,2	13,0	135
Pasco	51,0	41,2	7,7	26,0	66,3	7,7	72,3	19,6	8,0	223
Piura	56,7	36,6	6,7	22,6	70,6	6,7	74,0	19,6	6,4	1 447
Puno	36,8	55,0	8,2	32,2	54,3	13,5	58,0	33,5	8,5	959
San Martín	52,1	44,4	3,5	28,1	68,7	3,1	78,4	18,9	2,7	653
Tacna	65,6	29,2	5,2	14,4	82,4	3,2	79,0	15,4	5,6	291
Tumbes	71,7	27,2	1,1	15,1	83,9	1,0	84,4	13,4	2,3	190
Ucayali	66,9	27,4	5,7	29,7	64,8	5,5	79,6	14,0	6,4	324
Total 2012	58,0	35,4	6,6	20,7	72,7	6,6	72,1	20,6	7,2	23 888
Total 2009	54,0	36,7	9,4	31,8	59,1	9,1	69,4	20,2	10,4	24 212

1/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

11.3 CONOCIMIENTO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)


Los programas de control de VIH reconocen, en la actualidad, la importancia de controlar las ITS para reducir la transmisión del virus. Se reconoce que entre los esfuerzos necesarios, uno de los más importantes es la educación para que la población reconozca los síntomas de las ITS. Asimismo, poco se sabe sobre cómo las personas perciben y responden a las ITS. Por esta razón en la ENDES 2012, se preguntó a las entrevistadas si habían oído hablar de otras enfermedades que se pueden transmitir a través de las relaciones sexuales; cuáles son las enfermedades que conocía; y que síntomas y signos pueden hacer parecer que una mujer o un hombre tenía una infección de transmisión sexual. Los resultados se pueden apreciar en los Cuadros 11.7, 11.8, 11.9 y 11.10.

Conocimiento de las ITS (Cuadros 11.7 y 11.8)

- El conocimiento sobre las ITS se ha incrementado en 1,4 puntos porcentuales entre la ENDES 2009 y la ENDES 2012, pero si consideramos que el 36,6 por ciento de las mujeres entrevistadas declaró desconocer lo que éstas significan, entonces se debe reconocer que existe un grave problema por las importantes implicancias económicas y sociales que su alta morbilidad representa. Que más de la tercera parte de la población entrevistada no conozca de las ITS implica un riesgo potencial de adquirirlas, y esto incluye la posibilidad de padecer secuelas y complicaciones importantes de no atenderlas a tiempo.
- El mayor desconocimiento de las ITS se presentó entre las mujeres sin educación y con primaria (78,5 y 69,0 por ciento, respectivamente), así como en las mujeres ubicadas en el quintil inferior (70,5 por ciento). Por ámbito geográfico las del área rural (63,9 por ciento) y de la Sierra (53,4 por ciento), por su desconocimiento sobre las ITS.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

- Los departamentos donde las mujeres entrevistadas registraron mayor desconocimiento de las ITS fueron: Huancavelica (70,8 por ciento), Puno (67,5 por ciento), Ayacucho (64,5 por ciento) y Cajamarca (63,3 por ciento) y donde las acciones para revertir estas cifras debería ser de prioridad.
- Un 22,0 por ciento de las mujeres entrevistadas no conocía síntomas de las ITS (2,9 puntos porcentuales más que en el 2009), 14,8 por ciento conocía un síntoma y 26,6 por ciento dos o más síntomas. Estos porcentajes resultan bajos, en tanto significa que una gran mayoría de personas con una ITS no sabría identificarla con el consiguiente riesgo de transmitir a otras personas, no recibir un tratamiento oportuno y padecer secuelas o complicaciones a futuro.
- En comparación con encuestas anteriores, hay menos mujeres que conocen ITS específicas entre quienes conocen síntomas: de 44,6 por ciento que conocían la sífilis y 43,6 por ciento la gonorrea en la ENDES 2009, bajó a 42,3 y 39,4 por ciento, respectivamente en la ENDES 2012. Asimismo hubo un aumento en el porcentaje de mujeres que conocen verrugas genitales/condiloma ya que de 3,2 por ciento en el año 2009 pasó a 4,1 por ciento en el año 2012.
- La sífilis fue la enfermedad más reconocida en las mujeres con nivel superior (59,8 por ciento) y el quintil superior de riqueza (53,0 por ciento). Por área de residencia fue mayor en la urbana (45,5 por ciento), por región natural en Lima Metropolitana (46,9 por ciento) y, por departamento en Junín (52,2 por ciento) y Lambayeque (50,0 por ciento).
- La gonorrea fue más conocida en mujeres con educación superior (53,4 por ciento), de 20 a 24 y de 25 a 29 años de edad (46,5 y 46,3 por ciento, respectivamente) y, las solteras que han tenido relaciones sexuales (45,6 por ciento). Por área de residencia fue mayor en la urbana (41,4 por ciento), por región natural en la Selva (56,5 por ciento) y, por departamento en Loreto (68,4 por ciento) y San Martín (67,5 por ciento).
- El chancro fue más conocido en mujeres con educación superior (28,3 por ciento) y, en mujeres de 25 a 29 años de edad (25,0 por ciento). Por área de residencia fue mayor en la urbana (21,5 por ciento), por región natural en la Selva (27,8 por ciento) y, por departamento en Junín (38,0 por ciento) y Ayacucho (35,3 por ciento).

CUADRO N° 11.7
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y
MUJERES QUE CONOCEN ITS ESPECÍFICAS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2012

(Porcentaje)

Característica seleccionada	Total	No conoce sobre las ITS	Síntomas específicos de las ITS			Número de mujeres	Conoce ITS específicas						Número de mujeres que conocen síntomas
			No conoce síntomas de ITS	Conoce un síntoma	Conoce dos o más síntomas		Sífilis	Gonorrea	Verrugas genitales/ Condiloma	Chancro	Herpes	Otras ITS 1/	
Edad													
15-19	100,0	44,3	25,9	13,3	16,5	4 423	29,3	32,7	2,6	12,8	15,0	6,7	2 465
20-24	100,0	33,6	22,3	15,9	28,2	3 517	45,9	46,5	4,1	24,4	15,8	11,2	2 337
25-29	100,0	31,3	20,5	16,7	31,5	3 387	48,5	46,3	4,4	25,0	11,3	10,1	2 327
30-39	100,0	34,0	20,3	15,1	30,6	6 753	46,5	38,3	4,9	21,5	9,3	11,4	4 458
40-49	100,0	38,7	21,9	13,7	25,7	5 807	39,4	36,1	3,8	21,8	7,0	9,6	3 558
15-24	100,0	39,5	24,3	14,4	21,7	7 941	37,4	39,4	3,3	18,4	15,4	8,9	4 802
Estado conyugal													
Soltera	100,0	32,8	24,6	15,9	26,7	7 839	40,6	42,1	4,3	20,5	16,0	9,4	5 267
Ha tenido RS	100,0	23,0	22,8	16,9	37,3	3 380	45,9	45,6	5,6	23,5	15,1	11,4	2 601
Nunca ha tenido RS	100,0	40,2	26,0	15,1	18,6	4 460	35,5	38,7	3,0	17,5	16,8	7,5	2 666
Casada o Conviviente	100,0	39,9	20,6	14,2	25,3	13 624	42,6	37,6	3,7	21,1	8,3	10,2	8 194
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	30,5	21,7	14,5	33,3	2 425	45,5	39,4	5,0	23,6	8,2	10,6	1 684
Nivel de educación													
Sin educación	100,0	78,5	15,3	4,1	2,1	579	4,6	9,0	0,0	11,4	1,7	3,3	124
Primaria	100,0	69,0	18,1	5,7	7,2	5 352	10,4	17,5	2,0	14,0	1,9	5,2	1 662
Secundaria	100,0	36,0	25,5	16,0	22,5	11 199	35,1	32,8	2,8	16,7	8,7	8,4	7 169
Superior	100,0	8,4	20,0	20,7	50,8	6 757	59,8	53,4	6,2	28,3	16,2	13,3	6 190
Quintil de riqueza													
Quintil inferior	100,0	70,5	17,9	5,6	6,0	3 628	13,5	24,4	1,3	14,8	2,2	5,5	1 070
Segundo quintil	100,0	52,7	21,1	10,3	15,9	4 479	29,0	33,5	3,1	22,1	5,8	6,6	2 119
Quintil intermedio	100,0	36,1	23,3	15,5	25,1	5 309	40,3	38,1	4,0	20,0	8,8	8,3	3 392
Cuarto quintil	100,0	24,1	24,2	18,0	33,7	5 231	46,4	41,4	3,6	22,0	10,6	9,2	3 972
Quintil superior	100,0	12,4	22,3	21,0	44,3	5 243	53,0	44,7	5,6	22,2	17,3	14,6	4 592
Total 2012	100,0	36,6	22,0	14,8	26,6	23 888	42,3	39,4	4,1	21,1	11,0	10,0	15 145
Total 2009	100,0	38,0	19,1	16,6	26,3	24 212	44,6	43,6	3,2	19,7	nd	40,1	15 015

nd= No disponible.

1/ A partir del año 2010, se excluye Herpes.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO N° 11.8

PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y MUJERES QUE CONOCEN ITS ESPECÍFICAS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Total	No conoce sobre las ITS	Síntomas específicos de las ITS			Número de mujeres	Conoce ITS específicas						Número de mujeres que conocen síntomas
			No conoce síntomas de ITS	Conoce un síntoma	Conoce dos o más síntomas		Sífilis	Gonorrea	Verrugas genitales/ Condiloma	Chancro	Herpes	Otras ITS 1/	
Área de residencia													
Urbana	100,0	27,4	23,1	17,2	32,3	17 866	45,5	41,4	4,4	21,5	12,0	10,6	12 971
Rural	100,0	63,9	19,0	7,5	9,7	6 022	22,9	27,3	2,3	18,9	4,6	6,6	2 174
Región natural													
Lima Metropolitana	100,0	19,9	23,6	18,3	38,3	7 508	46,9	36,3	4,5	20,2	14,7	13,7	6 017
Resto Costa	100,0	39,0	20,9	15,1	25,0	5 715	45,3	43,9	4,6	17,5	10,6	8,1	3 484
Sierra	100,0	53,4	20,4	11,4	14,8	7 742	33,9	30,4	3,0	22,5	7,8	6,2	3 610
Selva	100,0	30,4	24,7	14,1	30,8	2 923	38,0	56,5	3,7	27,8	6,0	9,1	2 034
Departamento													
Amazonas	100,0	44,2	25,5	15,4	15,0	330	25,8	31,2	2,6	25,7	5,8	1,5	184
Áncash	100,0	37,0	26,9	17,5	18,7	1 090	29,7	25,2	7,5	11,9	9,1	2,8	687
Apurímac	100,0	35,9	37,0	14,6	12,5	360	21,5	14,7	2,1	17,5	3,2	7,0	231
Arequipa	100,0	24,7	34,4	21,6	19,3	906	35,5	35,9	2,2	19,9	8,2	2,9	682
Ayacucho	100,0	64,5	14,1	9,3	12,1	683	37,1	35,8	5,7	35,3	5,9	7,0	242
Cajamarca	100,0	63,6	14,5	6,3	15,5	1 146	37,2	35,0	2,0	25,6	7,6	3,7	417
Cusco	100,0	54,0	11,9	11,5	22,6	954	42,4	35,9	2,7	29,5	10,9	10,7	439
Huancavelica	100,0	70,8	11,4	7,2	10,6	363	33,3	28,5	3,6	35,0	6,3	13,9	106
Huánuco	100,0	26,8	42,4	9,0	21,8	685	22,8	19,2	2,3	19,1	7,2	9,8	502
Ica	100,0	25,5	21,2	15,2	38,1	631	45,4	43,6	5,6	21,3	9,2	13,9	470
Junín	100,0	38,0	19,1	17,9	25,1	1 010	52,2	44,8	3,7	38,0	10,4	7,9	626
La Libertad	100,0	60,8	17,2	8,1	13,9	1 357	49,9	51,1	2,7	16,3	7,8	5,8	532
Lambayeque	100,0	49,1	19,3	12,0	19,6	955	50,0	49,9	1,6	21,1	13,3	5,4	486
Lima 2/	100,0	21,8	23,1	18,0	37,1	8 348	46,8	36,7	4,8	19,8	14,3	13,3	6 527
Loreto	100,0	28,2	26,1	15,3	30,5	731	34,9	68,4	4,4	25,9	5,0	13,6	525
Madre de Dios	100,0	27,2	20,2	12,2	40,3	116	49,2	50,2	4,7	33,4	6,2	5,6	85
Moquegua	100,0	26,8	24,2	18,6	30,3	135	38,7	32,1	2,0	18,9	13,2	9,9	99
Pasco	100,0	58,6	10,1	11,5	19,9	223	46,8	40,5	4,3	25,8	8,4	6,8	93
Piura	100,0	47,6	17,9	14,2	20,3	1 447	46,9	46,8	3,9	15,2	9,5	7,8	759
Puno	100,0	67,5	19,7	6,2	6,5	959	19,3	25,4	2,2	12,5	3,7	5,7	311
San Martín	100,0	19,8	23,2	18,1	38,9	653	40,3	67,5	2,0	25,2	7,3	9,6	524
Tacna	100,0	28,7	22,1	20,1	29,0	291	39,7	33,9	3,6	18,3	12,5	13,3	207
Tumbes	100,0	27,9	15,8	17,7	38,7	190	46,9	45,3	5,1	20,2	14,7	2,9	137
Ucayali	100,0	15,5	32,3	15,5	36,7	324	34,7	55,3	5,8	21,6	6,0	7,0	274
Total 2012	100,0	36,6	22,0	14,8	26,6	23 888	42,3	39,4	4,1	21,1	11,0	10,0	15 145
Total 2009	100,0	38,0	19,1	16,6	26,3	24 212	44,6	43,6	3,2	19,7	nd	40,1	15 015

nd= No disponible.

1/ A partir del año 2010, se excluye Herpes.

2/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Síntomas y signos de las ITS (Cuadros 11.9 y 11.10)

- En cuanto a los síntomas y signos específicos que las mujeres entrevistadas con conocimiento de ITS manifestaron, la mayoría refirió que fue el enrojecimiento/picazón en genitales (30,5 por ciento), seguido de úlceras/llagas genitales (21,0 por ciento), inflamación o hinchazón en genitales (18,9 por ciento) y secreción mal oliente (15,6 por ciento).
- En relación al enrojecimiento/picazón en genitales, el mayor porcentaje por característica seleccionada fue entre las mujeres con educación superior (39,2 por ciento), ubicadas en el quintil superior de riqueza (36,9 por ciento) y divorciadas/separadas/viudas (36,6 por ciento). Por ámbito geográfico, las residentes en el área urbana (32,4 por ciento) y en Lima Metropolitana (34,7 por ciento).
- Las úlceras/llagas genitales fueron referidas en mayor porcentaje por característica seleccionada entre las mujeres con educación superior (29,4 por ciento), solteras que han tenido relaciones sexuales (27,6 por ciento) y ubicadas en el quintil superior de riqueza (27,1 por ciento). Por área de residencia, las residentes en el área urbana (22,7 por ciento) y por región natural en Lima Metropolitana (25,7 por ciento).
- La inflamación o hinchazón en genitales por característica seleccionada, fue manifestada más por mujeres con educación superior (24,0 por ciento), seguido de las ubicadas en el quintil superior de riqueza (23,1 por ciento), las solteras que han tenido relaciones sexuales (22,1 por ciento) y las divorciadas/separadas/viudas (21,6 por ciento). Por ámbito geográfico, en el área urbana (19,9 por ciento) y las residentes en Lima Metropolitana (22,0 por ciento).
- Aunque no se especifica cuáles son, 18,6 por ciento de las mujeres con conocimiento de las ITS refirió que identifican “otros síntomas”.
- Las mujeres entrevistadas que en mayor porcentaje identificaron el enrojecimiento/picazón en genitales, residían en los departamentos de Ica (39,8 por ciento) y San Martín (38,7 por ciento), las úlceras/llagas genitales en Tumbes (31,5 por ciento) y Madre de Dios (28,9 por ciento) y la inflamación o hinchazón en genitales en San Martín (29,1 por ciento) y Madre de Dios (22,9 por ciento).
- Llama la atención que un síntoma evidente como es la secreción o pus por el pene solo fue reconocido en un 4,8 por ciento para el año 2012, cuando en el 2009 fue de 6,8 por ciento. Las verrugas genitales se identificó como probable ITS por solo el 8,7 por ciento de mujeres entrevistadas.
- En general se observa que el desconocimiento de las ITS, algunas de ellas específicas, y de sus signos y síntomas fue mayor en la población rural, en la Sierra, en las mujeres con menor nivel educativo y, en situación de pobreza, aspectos que deben ser enfrentados y revertidos, básicamente, para evitar la influencia de las ITS como factor de riesgo para adquirir el VIH o de sufrir secuelas y complicaciones (infertilidad, cáncer genital, abortos, embarazos ectópicos, etc.) que afectan la calidad de vida de las mujeres.

CUADRO N° 11.9
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS),
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2012
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Síntomas y signos de las infecciones de transmisión sexual (ITS)														Número de mujeres
	Dolor abdominal	Secreción por genital 1/	Secreción maloliente	Molestia al orinar	Enrojecimiento/ Picação en genitales	Inflamación o hinchazón en genitales	Úlceras/ Llagas genitales	Verrugas genitales	Sangre en la orina	Pérdida de peso	Puede no haber síntomas	Impotencia / Infertilidad	Secreción o pus por el pene	Otros síntomas	
Grupo de edad															
15-19	2,8	8,7	8,5	9,9	19,9	12,9	18,2	6,5	1,5	14,9	1,2	0,7	3,1	18,0	2 465
20-24	5,6	15,7	13,7	12,5	30,8	18,8	22,9	8,6	2,4	15,5	1,1	0,8	3,9	21,9	2 337
25-29	5,4	16,3	17,5	12,5	32,6	20,1	24,9	11,1	1,9	16,0	1,7	0,2	4,7	20,5	2 327
30-39	5,6	16,8	17,7	12,2	33,2	20,0	21,7	10,3	2,9	13,7	1,5	0,6	4,8	17,6	4 458
40-49	3,8	15,3	17,7	10,8	32,7	20,9	18,3	6,7	1,4	13,6	1,3	0,2	6,5	16,7	3 558
15-24	4,2	12,1	11,0	11,1	25,2	15,8	20,5	7,5	2,0	15,2	1,1	0,8	3,5	19,9	4 802
Estado conyugal															
Soltera	4,3	12,8	12,8	11,0	27,9	18,1	23,3	8,6	2,2	16,8	1,2	0,7	3,1	20,1	5 267
Ha tenido RS	5,0	16,0	16,9	13,5	33,5	22,1	27,6	10,3	2,4	16,1	1,4	0,4	4,0	19,1	2 601
Nunca ha tenido RS	3,7	9,7	8,8	8,7	22,3	14,2	19,0	7,0	2,0	17,5	0,9	0,9	2,2	21,1	2 666
Casada o Conviviente	4,9	15,9	16,7	11,6	30,9	18,8	19,5	8,8	2,1	13,5	1,4	0,4	5,4	17,4	8 194
Divorciada/Separada/Viuda	4,6	16,5	18,6	13,4	36,6	21,6	21,4	8,8	1,7	12,5	1,9	0,5	7,1	19,5	1 684
Nivel de educación															
Sin educación	4,5	4,5	5,4	3,4	9,0	6,7	3,2	0,1	0,0	7,2	0,0	0,0	3,2	3,4	124
Primaria	4,6	9,8	8,8	7,8	16,0	11,9	8,1	2,4	0,7	8,2	0,9	0,4	3,9	9,9	1 662
Secundaria	3,8	11,6	11,2	9,6	26,6	16,3	17,1	6,8	1,9	14,9	1,3	0,5	4,6	18,4	7 169
Superior	5,8	20,3	22,6	15,1	39,2	24,0	29,4	12,8	2,7	15,9	1,6	0,6	5,2	21,4	6 190
Quintil de riqueza															
Quintil inferior	4,5	9,0	7,5	7,7	13,8	10,4	5,5	1,4	0,9	8,5	0,9	0,5	4,8	10,3	1 070
Segundo quintil	5,5	12,9	12,1	11,4	24,3	14,8	15,0	4,7	1,9	13,5	1,3	0,5	5,6	16,4	2 119
Quintil intermedio	5,2	13,9	14,3	11,3	30,3	18,6	18,8	7,4	1,8	14,5	1,6	0,5	4,4	18,9	3 392
Cuarto quintil	5,1	15,9	16,1	11,9	30,9	18,7	23,3	9,9	2,4	15,9	1,3	0,6	4,4	20,6	3 972
Quintil superior	3,6	17,0	19,5	12,5	36,9	23,1	27,1	12,2	2,4	15,3	1,4	0,4	5,0	19,6	4 592
Total 2012	4,7	14,9	15,6	11,6	30,5	18,9	21,0	8,7	2,1	14,5	1,4	0,5	4,8	18,6	15 145
Total 2009	5,6	18,6	15,8	11,6	31,1	19,2	20,0	6,6	1,8	15,4	1,9	0,6	6,8	24,8	15 015

1/ A partir del año 2004 en la variable secreción por genital incluye secreción de flujo por la vagina y secreción/goteos en genitales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO N° 11.10
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012

(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Síntomas y signos de las infecciones de transmisión sexual (ITS)														Número de mujeres
	Dolor abdominal	Secreción por genital 1/	Secreción maloliente	Molestia al orinar	Enrojecimiento/ Picazón en genitales	Inflamación o hinchazón en genitales	Úlceras/ Llagas genitales	Verrugas genitales	Sangre en la orina	Pérdida de peso	Puede no haber síntomas	Impotencia / Infertilidad	Secreción o pus por el pene	Otros síntomas	
Área de residencia															
Urbana	4,6	15,7	16,7	11,9	32,4	19,9	22,7	9,4	2,2	15,0	1,4	0,5	5,0	19,6	12 971
Rural	4,9	10,1	9,0	9,4	18,8	12,9	10,8	4,3	1,5	12,0	1,0	0,4	3,1	12,5	2 174
Región natural															
Lima Metropolitana	3,8	13,6	16,7	12,8	34,7	22,0	25,7	10,9	2,6	15,7	1,3	0,7	4,2	20,4	6 017
Resto Costa	4,5	16,5	15,3	9,4	30,2	17,8	21,2	8,6	2,0	14,9	1,3	0,3	4,6	18,5	3 484
Sierra	5,3	12,7	12,5	8,9	24,1	14,0	15,2	6,9	1,6	14,0	1,2	0,3	1,0	17,7	3 610
Selva	6,7	19,8	18,1	16,3	29,6	20,1	17,2	5,4	1,4	11,4	2,1	0,4	13,4	14,6	2 034
Departamento															
Amazonas	11,2	11,7	11,3	5,7	18,2	13,0	12,6	4,5	0,9	9,3	2,4	1,0	1,5	19,4	184
Áncash	4,5	12,7	12,6	5,6	22,7	17,4	12,6	6,3	1,2	16,3	0,7	0,1	0,5	22,5	687
Apurímac	4,1	8,2	6,8	3,7	11,7	7,4	9,6	3,9	1,0	18,8	0,9	0,3	1,0	12,0	231
Arequipa	1,3	6,7	11,5	5,5	24,9	13,1	14,0	10,7	0,7	10,0	0,9	0,1	0,8	17,1	682
Ayacucho	2,5	14,4	18,4	6,9	28,5	15,8	20,9	9,6	0,2	12,5	2,7	1,1	1,8	14,8	242
Cajamarca	9,7	25,3	12,4	11,0	33,8	18,0	16,4	5,1	0,3	14,1	0,3	0,3	0,9	10,6	417
Cusco	8,8	19,7	14,5	14,4	35,2	20,5	26,3	10,0	4,6	11,5	1,7	0,5	1,0	28,5	439
Huancavelica	10,4	9,6	18,3	17,0	21,3	9,3	10,4	2,9	2,5	19,3	1,2	0,8	1,9	19,1	106
Huánuco	8,9	8,1	14,7	10,1	18,7	11,1	11,5	4,8	1,0	9,8	1,3	0,6	3,3	4,6	502
Ica	6,1	17,6	16,8	13,3	39,8	21,0	25,3	15,4	2,6	8,3	2,3	0,5	13,6	21,2	470
Junín	5,4	11,2	17,6	12,3	26,6	13,8	20,8	6,4	2,8	23,5	1,1	0,2	1,7	21,0	626
La Libertad	1,1	9,1	16,1	8,8	29,1	12,8	18,2	5,2	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	3,0	532
Lambayeque	7,2	13,4	12,2	9,2	30,6	20,2	19,5	2,3	1,2	12,7	1,2	0,3	5,4	15,0	486
Lima 2/	3,9	14,0	16,7	12,8	33,9	21,8	25,6	11,1	2,8	16,2	1,3	0,7	4,5	20,7	6 527
Loreto	8,0	22,6	14,7	19,2	25,5	20,0	13,1	2,1	2,0	12,2	2,4	0,2	16,1	27,0	525
Madre de Dios	7,6	21,5	24,8	24,0	25,9	22,9	28,9	10,2	2,2	14,2	0,4	0,9	6,1	6,0	85
Moquegua	2,1	21,7	24,0	12,7	28,6	22,8	20,2	5,0	1,8	14,4	4,5	0,9	1,7	11,7	99
Pasco	6,2	17,8	16,7	13,8	34,9	19,1	22,0	11,4	1,2	27,3	1,0	1,3	3,9	15,4	93
Piura	2,8	22,1	13,6	5,2	31,6	16,2	21,1	7,0	1,7	13,2	1,1	0,3	1,2	19,8	759
Puno	3,4	8,5	11,4	7,4	11,6	9,4	8,3	6,8	0,3	7,9	2,2	0,5	0,3	18,0	311
San Martín	3,6	20,2	20,8	18,1	38,7	29,1	15,2	4,3	1,5	10,7	2,5	0,1	17,4	10,3	524
Tacna	3,7	16,3	10,3	13,0	30,1	14,3	20,8	16,7	2,2	15,4	0,9	0,0	3,3	28,9	207
Tumbes	7,9	31,5	16,5	14,5	35,4	21,7	31,5	4,4	3,7	26,2	3,3	0,2	9,7	26,5	137
Ucayali	5,4	27,8	17,6	17,5	24,5	14,2	21,3	8,8	0,5	5,2	3,0	0,0	25,3	10,4	274
Total 2012	4,7	14,9	15,6	11,6	30,5	18,9	21,0	8,7	2,1	14,5	1,4	0,5	4,8	18,6	15 145
Total 2009	5,6	18,6	15,8	11,6	31,1	19,2	20,0	6,6	1,8	15,4	1,9	0,6	6,8	24,8	15 015

1/ A partir del año 2004 en la variable secreción por genital incluye secreción de flujo por la vagina y secreción/goteos en genitales.

2/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

11.4 PREVALENCIA DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

A las mujeres entrevistadas se les hizo una serie de preguntas para disponer de información que facilite la estimación de la prevalencia de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). En particular, a cada mujer entrevistada se le preguntó si en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista le diagnosticaron alguna infección de transmisión sexual, si había tenido algún flujo o secreción genital, si había tenido llaga o úlceras en sus genitales y, a las que tuvieron alguno de esos problemas se les preguntó a quién acudió en búsqueda de consejo o tratamiento. El detalle de los resultados por características seleccionadas y ámbito geográfico se presenta en los Cuadros 11.11, 11.12, 11.13 y 11.14.

Prevalencia de ITS (Cuadros 11.11 y 11.12)

- Entre las mujeres entrevistadas que respondieron haber mantenido relaciones sexuales, un 0,7 por ciento informó haber tenido una ITS y/o síntomas asociados en los 12 meses anteriores a la entrevista. En la ENDES 2009 fue 0,6 por ciento.
- Según características de las mujeres que respondieron haber padecido una ITS, el mayor porcentaje aparece en las que pertenecen al quintil superior de riqueza (1,2 por ciento), y con educación superior (1,1 por ciento).
- Los departamentos, que registraron los más altos porcentaje de mujeres con episodios de ITS fueron: Moquegua (2,8 por ciento), Ucayali (1,7 por ciento) y Junín (1,2 por ciento).
- El 13,7 por ciento de mujeres declaró tener una ITS o flujo vaginal o úlceras/ llagas genitales, porcentaje reducido en 0,2 puntos porcentuales, respecto al año 2009 (13,9 por ciento). El mayor porcentaje fue declarado por mujeres de 15 a 19 y de 15 a 24 años de edad (18,0 y 16,4 por ciento, respectivamente), y las solteras (15,7 por ciento). Por área de residencia, fue mayor en la urbana (14,5 por ciento) y por departamento, fue mayor en Apurímac (28,0 por ciento), Cusco (21,8 por ciento) y Moquegua (18,7 por ciento).

CUADRO Nº 11.11

PERÚ: MUJERES POR PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SÍNTOMAS DE ITS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2012
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Informó ITS o síntoma			Porcentaje de mujeres con una ITS o flujo vaginal o úlceras/llagas	Número de mujeres
	Porcentaje con una ITS	Porcentaje con flujo vaginal	Úlceras/llagas genitales		
Edad					
15-19	0,4	17,0	2,6	18,0	1 290
20-24	0,9	13,5	2,3	15,6	2 782
25-29	1,0	13,8	2,0	15,6	3 099
30-39	0,9	11,1	1,6	12,7	6 556
40-49	0,3	10,8	1,4	11,8	5 700
15-24	0,8	14,6	2,4	16,4	4 072
Estado conyugal					
Soltera	0,6	13,9	2,0	15,7	3 380
Casada o Conviviente	0,7	11,6	1,7	13,1	13 624
Divorciada/Separada/Viuda	1,0	12,8	1,8	14,4	2 423
Nivel de educación					
Sin educación	0,0	8,6	1,4	9,3	559
Primaria	0,3	11,0	1,6	11,8	4 998
Secundaria	0,8	13,1	2,1	14,8	8 182
Superior	1,1	12,2	1,5	14,1	5 688
Quintil de riqueza					
Quintil inferior	0,3	8,9	1,2	9,5	3 032
Segundo quintil	0,5	13,0	2,0	14,4	3 765
Quintil intermedio	1,0	13,0	2,3	15,0	4 397
Cuarto quintil	0,5	13,1	1,4	14,2	4 171
Quintil superior	1,2	12,0	1,9	14,2	4 061
Total 2012	0,7	12,2	1,8	13,7	19 427
Total 2009	0,6	12,8	2,1	13,9	19 310

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).


CUADRO N° 11.12
 PERÚ: MUJERES POR PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SÍNTOMAS DE ITS EN
 LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Informó ITS o síntoma			Porcentaje de mujeres con una ITS o flujo vaginal o úlceras/llagas	Número de mujeres
	Porcentaje con una ITS	Porcentaje con flujo vaginal	Úlceras/llagas genitales		
Área de residencia					
Urbana	0,9	12,8	1,9	14,5	14 416
Rural	0,4	10,4	1,5	11,2	5 011
Región natural					
Lima Metropolitana	1,1	14,6	2,3	17,0	6 020
Resto Costa	0,6	10,1	2,0	11,4	4 580
Sierra	0,5	12,7	1,4	13,6	6 206
Selva	0,8	8,7	1,2	10,1	2 621
Departamento					
Amazonas	0,3	6,5	1,1	7,5	283
Áncash	0,7	12,3	2,0	13,8	872
Apurímac	0,3	27,7	1,4	28,0	290
Arequipa	0,1	8,6	1,5	9,4	708
Ayacucho	0,2	17,2	2,9	18,3	561
Cajamarca	0,0	5,9	1,0	6,3	944
Cusco	0,9	20,1	2,1	21,8	774
Huancavelica	0,4	14,1	0,7	14,7	293
Huánuco	0,4	9,2	1,6	9,7	568
Ica	0,4	4,4	1,2	5,6	514
Junín	1,2	15,9	1,4	17,3	816
La Libertad	0,2	1,9	0,5	2,4	1 085
Lambayeque	0,6	11,4	1,4	12,9	746
Lima 1/	1,1	15,3	2,4	17,6	6 727
Loreto	0,4	5,3	0,8	6,1	673
Madre de Dios	0,7	11,7	1,4	13,1	104
Moquegua	2,8	14,9	3,7	18,7	111
Pasco	0,4	14,4	1,2	15,4	182
Piura	0,3	8,9	2,1	10,0	1 141
Puno	0,6	11,9	1,0	12,9	758
San Martín	1,0	9,1	1,0	10,7	590
Tacna	1,0	15,2	2,7	17,5	238
Tumbes	0,5	11,9	3,7	14,6	159
Ucayali	1,7	4,7	0,3	6,6	289
Total 2012	0,7	12,2	1,8	13,7	19 427
Total 2009	0,6	12,8	2,1	13,9	19 310

1/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

GRÁFICO N° 11.5
 PERÚ: PREVALENCIA DE ITS Y/O SÍNTOMAS ASOCIADOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES,
 SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2012
 (Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

GRÁFICO N° 11.6
 PERÚ: PORCENTAJE DE MUJERES CON UNA ITS O FLUJO VAGINAL O ÚLCERAS/LLAGAS,
 SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA, 2009 Y 2012
 (Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Fuente de consejo o tratamiento de las ITS (Cuadros 11.13 y 11.14)

- Entre las mujeres que tuvieron una ITS en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista, el 66,3 por ciento buscó consejo o tratamiento por un médico y un 81,0 por ciento recibió de cualquier fuente en comparación con un 10,5 por ciento que no recibió ni consejo ni tratamiento y un 4,4 por ciento se autorecetó, es decir, utilizó medicamentos por su cuenta. Otras fuentes mencionadas fueron los curanderos (6,3 por ciento) y las farmacias/boticas (23,5 por ciento).
- Las entrevistadas que en mayor porcentaje consultaron a un médico fueron las mujeres ubicadas en el cuarto quintil de riqueza (71,9 por ciento), seguido de las mujeres entre 30 y 39 años de edad (71,5 por ciento) y con educación superior (70,7 por ciento). Por área de residencia fue mayor en el área urbana 66,6 por ciento.
- Al curandero fueron, mayormente, mujeres sin educación (17,4 por ciento) y del quintil inferior de riqueza (15,9 por ciento). Por estado conyugal fueron las divorciadas/separadas/viudas (7,1 por ciento). Por ámbito geográfico, las del área rural (15,5 por ciento), la región Sierra (12,8 por ciento) y por departamento en Puno (23,1 por ciento) y Cajamarca (21,5 por ciento).
- A la farmacia/botica acudieron más las mujeres del segundo quintil de riqueza (28,3 por ciento), de 15 a 19 años de edad (27,6 por ciento) y las divorciadas/separadas/viudas (27,0 por ciento). Por área de residencia el mayor porcentaje estuvo en la urbana (23,7 por ciento). Por región natural, en el resto Costa (26,1 por ciento) y, por departamento en Madre de Dios (42,6 por ciento) y Huánuco (36,5 por ciento).

CUADRO N° 11.13
PERÚ: MUJERES QUE RECIBIERON CONSEJO O TRATAMIENTO PARA UNA ITS, POR FUENTE DE TRATAMIENTO,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2012
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Fuente de tratamiento de ITS 1/				Consejo o tratamiento de amigos o familiares	Se auto-recetó	Ni consejo ni tratamiento	Número de mujeres con una ITS 2/
	Médico	Curandero	Farmacia / Botica	Consejo o tratamiento de cualquier fuente				
Edad								
15-19	51,5	3,9	27,6	67,7	12,7	2,9	16,8	233
20-24	67,2	3,8	26,4	80,9	4,1	2,5	12,5	434
25-29	66,6	6,2	21,6	79,4	5,3	4,2	11,2	483
30-39	71,5	6,9	22,4	84,8	2,9	4,5	7,8	835
40-49	64,1	8,1	22,8	82,1	1,7	6,3	9,8	673
15-24	61,7	3,8	26,8	76,3	7,1	2,6	14,0	666
Estado conyugal								
Soltera	63,5	3,7	25,2	79,5	5,8	1,4	13,3	530
Casada o Conviviente	68,9	6,9	22,3	82,0	3,3	5,1	9,6	1 779
Divorciada/Separada/Viuda	57,2	7,1	27,0	78,1	5,7	5,8	10,4	349
Nivel de educación								
Sin educación	53,7	17,4	17,9	74,7	2,1	10,4	12,8	52
Primaria	60,8	11,3	24,3	76,3	3,5	6,3	13,9	592
Secundaria	66,6	6,5	23,3	81,0	5,9	4,6	8,6	1 210
Superior	70,7	1,7	23,5	84,9	2,0	2,5	10,6	803
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	58,3	15,9	22,1	72,4	7,1	5,0	15,5	288
Segundo quintil	61,9	11,1	28,3	79,3	4,9	4,2	11,6	544
Quintil intermedio	65,6	5,1	25,2	81,4	4,7	6,0	7,8	657
Cuarto quintil	71,9	3,3	19,9	84,6	2,7	4,1	8,6	591
Quintil superior	69,4	1,4	21,3	82,7	2,7	2,8	11,9	577
Total 2012	66,3	6,3	23,5	81,0	4,1	4,4	10,5	2 657
Total 2009	65,8	6,1	17,9	76,5	3,1	6,6	13,7	2 796

1/ Las entrevistadas podían informar más de una fuente de tratamiento.

2/ Incluye las mujeres que informaron tener una ITS o flujo vaginal o llagas/granos genitales, en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO N° 11.14
 PERÚ: MUJERES QUE RECIBIERON CONSEJO O TRATAMIENTO PARA UNA ITS, POR FUENTE DE TRATAMIENTO,
 SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Fuente de tratamiento de ITS 1/				Consejo o tratamiento de amigos o familiares	Se auto-recetó	Ni consejo ni tratamiento	Número de mujeres con una ITS 2/
	Médico	Curandero	Farmacia / Botica	Consejo o tratamiento de cualquier fuente				
Área de residencia								
Urbana	66,6	3,8	23,7	81,7	4,1	4,4	9,8	2 097
Rural	64,9	15,5	22,7	78,2	4,2	4,6	13,0	560
Región natural								
Lima Metropolitana	68,9	2,2	19,8	82,0	3,5	4,9	9,5	1 025
Resto Costa	64,7	2,9	26,1	80,5	4,8	2,8	11,9	524
Sierra	63,1	12,8	24,4	79,0	4,4	5,0	11,6	845
Selva	69,1	8,1	29,3	84,3	3,9	4,2	7,6	264
Departamento								
Amazonas	83,6	11,9	24,7	89,2	2,0	0,9	8,0	21
Áncash	72,2	12,9	28,6	85,0	4,7	5,1	5,2	120
Apurímac	67,2	5,6	12,7	73,4	3,2	5,1	18,3	81
Arequipa	67,9	0,0	12,5	75,5	5,2	6,4	12,9	67
Ayacucho	63,5	12,1	15,8	77,3	3,1	3,3	16,3	103
Cajamarca	74,1	21,5	21,9	86,7	8,9	2,3	2,1	59
Cusco	59,9	9,2	30,4	82,0	6,5	5,3	6,2	169
Huancavelica	65,8	5,2	21,5	76,2	4,2	8,0	11,6	43
Huánuco	76,2	18,1	36,5	86,9	1,4	1,9	9,8	55
Ica	(57,8)	(3,9)	(30,5)	(75,9)	(11,3)	(6,6)	(6,2)	(28,8)
Junín	59,7	11,6	36,3	79,5	4,0	4,1	12,4	141
La Libertad	54,6	0,0	34,0	76,1	3,4	0,0	20,5	26
Lambayeque	66,0	3,2	21,4	77,7	4,6	0,6	17,0	97
Lima 3/	68,0	2,1	20,3	81,4	4,0	5,0	9,7	1 185
Loreto	67,7	9,5	32,0	85,1	4,8	0,0	10,1	41
Madre de Dios	75,0	7,4	42,6	90,0	2,8	4,3	2,8	14
Moquegua	69,3	9,5	19,9	81,4	1,7	6,2	10,7	21
Pasco	68,0	10,0	34,1	85,9	2,7	4,7	6,8	28
Piura	68,3	5,1	30,5	84,8	2,0	1,0	12,2	114
Puno	40,3	23,1	22,2	69,1	2,4	8,8	19,8	97
San Martín	68,4	6,2	30,8	89,8	3,3	3,6	3,3	63
Tacna	66,3	5,0	21,8	81,0	3,4	3,9	11,8	42
Tumbes	78,6	1,7	15,4	85,3	5,4	2,5	6,8	23
Ucayali	71,7	14,1	21,2	84,5	5,1	0,0	10,4	19
Total 2012	66,3	6,3	23,5	81,0	4,1	4,4	10,5	2 657
Total 2009	65,8	6,1	17,9	76,5	3,1	6,6	13,7	2 796

Nota: Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*) y los de 25-49 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis.

1/ Las entrevistadas podían informar más de una fuente de tratamiento.

2/ Incluye las mujeres que informaron tener una ITS o flujo vaginal o llagas/granos genitales, en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista.

3/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

11.5 CONDUCTA SEXUAL, USO DEL CONDÓN Y ACCESO AL CONDÓN

La conducta sexual individual y el uso de condón son determinantes claves del estatus de riesgo de contraer ITS y cuando esta información se agrega a nivel de la población, permite describir el contexto en el cual se deben diseñar e implementar los programas preventivos y curativos del VIH e ITS. En la ENDES 2012, se preguntó a las mujeres acerca de sus relaciones sexuales en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista, número de parejas sexuales, uso de condón en la última relación y conocimiento de fuentes. Asimismo se indagó acerca del nivel de conocimiento de la mujer respecto a la persona con quien mantuvo contacto sexual, para distinguir la pareja sexual regular de la no regular, cohabitante o no. Los resultados se detallan en los Cuadros 11.15 al 11.16.

Número de parejas sexuales de las mujeres no unidas (Cuadros 11.15 y 11.16)

- La distribución porcentual de mujeres no unidas por el número de personas con quienes tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista muestra que el 68,8 por ciento refirió no haber tenido pareja sexual (71,4 por ciento en el año 2009), 28,8 por ciento respondió haber tenido una pareja (26,5 por ciento en el año 2009), y 2,4 por ciento tuvo dos o más parejas (2,2 por ciento en el año 2009).
- Las mujeres sin educación un 89,8 por ciento respondieron en mayor porcentaje no haber tenido pareja sexual, seguido de las mujeres del quintil inferior de riqueza (84,7 por ciento).
- El departamento en el que se registró el mayor porcentaje de mujeres que respondió “ninguna pareja” fue Puno (84,2 por ciento), con una pareja y con dos o más parejas fue Ucayali con 47,2 y 7,7 por ciento, respectivamente.
- El área rural (81,1 por ciento) y la Sierra (78,5 por ciento) fueron los ámbitos donde se encontró un mayor porcentaje de mujeres que respondió no haber tenido pareja sexual, en los últimos 12 meses.
- Evidentemente, siendo la abstinencia un factor de protección para las ITS y el VIH, es importante alentar su práctica entre la población menor de edad y fomentar el concepto de que a menos parejas sexuales la exposición a contraer con el virus es menor.

CUADRO N° 11.15
 PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE LAS MUJERES NO UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES
 A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2012
 (Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	Número de parejas sexuales			Promedio de parejas	Número de mujeres
		Ninguna pareja	1	2 y más		
Edad						
15-19	100,0	84,5	13,8	1,7	0,2	3 928
20-24	100,0	55,2	40,9	3,9	0,5	1 982
25-29	100,0	50,5	45,8	3,8	0,5	1 223
30-39	100,0	59,5	38,1	2,3	0,4	1 679
40-49	100,0	71,2	27,6	1,2	0,3	1 453
15-24	100,0	74,7	22,9	2,4	0,3	5 910
Estado conyugal						
Soltera	100,0	70,9	26,8	2,3	0,3	7 839
Soltera ha tenido RS	100,0	32,6	62,2	5,2	0,7	3 380
Soltera no ha tenido RS	100,0	100,0	n.a.	n.a.	n.a.	4 460
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	62,0	35,1	2,9	0,4	2 425
Nivel de educación						
Sin educación	100,0	89,8	10,2	0,0	0,1	109
Primaria	100,0	78,8	20,0	1,3	0,2	1 208
Secundaria	100,0	75,3	23,0	1,8	0,3	5 481
Superior	100,0	54,5	41,6	3,8	0,5	3 465
Quintil de riqueza						
Quintil inferior	100,0	84,7	14,2	1,1	0,2	1 151
Segundo quintil	100,0	74,7	22,9	2,4	0,3	1 563
Quintil intermedio	100,0	68,1	29,8	2,0	0,3	2 193
Cuarto quintil	100,0	67,4	30,4	2,2	0,4	2 549
Quintil superior	100,0	61,0	35,7	3,3	0,4	2 809
Total 2012	100,0	68,8	28,8	2,4	0,3	10 264
Total 2009	100,0	71,4	26,5	2,2	0,3	10 384

na= No aplicable.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO N° 11.16

PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE LAS MUJERES NO UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES
A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012

(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	Número de parejas sexuales			Promedio de parejas	Número de mujeres
		Ninguna pareja	1	2 y más		
Área de residencia						
Urbana	100,0	66,0	31,3	2,8	0,4	8 325
Rural	100,0	81,1	18,1	0,8	0,2	1 939
Región natural						
Lima Metropolitana	100,0	63,1	33,5	3,4	0,4	3 820
Resto Costa	100,0	70,6	27,8	1,6	0,3	2 491
Sierra	100,0	78,5	20,5	1,0	0,2	3 022
Selva	100,0	56,3	38,9	4,8	0,5	932
Departamento						
Amazonas	100,0	71,5	28,3	0,2	0,3	103
Áncash	100,0	72,4	25,5	2,0	0,3	443
Apurímac	100,0	81,3	16,7	2,0	0,2	129
Arequipa	100,0	71,7	27,5	0,8	0,3	403
Ayacucho	100,0	79,0	20,6	0,5	0,2	248
Cajamarca	100,0	82,8	16,6	0,6	0,2	416
Cusco	100,0	72,9	24,4	2,7	0,3	349
Huancavelica	100,0	80,1	19,9	0,0	0,2	141
Huánuco	100,0	73,6	25,2	1,1	0,3	262
Ica	100,0	65,3	32,7	2,0	0,4	281
Junín	100,0	68,6	30,1	1,3	0,3	430
La Libertad	100,0	74,4	25,4	0,2	0,3	561
Lambayeque	100,0	73,0	26,0	1,0	0,3	417
Lima 1/	100,0	63,6	33,1	3,3	0,4	4 160
Loreto	100,0	47,9	45,2	7,0	0,6	231
Madre de Dios	100,0	53,4	41,3	5,4	0,5	38
Moquegua	100,0	70,0	27,6	2,5	0,3	60
Pasco	100,0	77,6	21,8	0,6	0,2	82
Piura	100,0	78,3	20,3	1,4	0,2	615
Puno	100,0	84,2	15,2	0,6	0,2	364
San Martín	100,0	56,4	36,8	6,7	0,5	212
Tacna	100,0	63,8	32,0	4,2	0,4	134
Tumbes	100,0	72,5	27,0	0,5	0,3	68
Ucayali	100,0	45,1	47,2	7,7	0,6	118
Total 2012	100,0	68,8	28,8	2,4	0,3	10 264
Total 2009	100,0	71,4	26,5	2,2	0,3	10 384

1/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Número de parejas sexuales de mujeres unidas (Cuadros 11.17 y 11.18)

- Evaluando la distribución porcentual de mujeres actualmente casadas o convivientes por número de personas con las que han tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista, se observa que la gran mayoría (97,8 por ciento) refirió haber tenido una sola pareja sexual incluyendo el esposo/compañero, lo cual se refuerza con el gran porcentaje de mujeres que manifestaron no haber tenido parejas sexuales (99,6 por ciento) excluyendo el esposo/compañero; en tanto, el 0,3 por ciento ha tenido dos o más parejas sexuales incluyendo el esposo/compañero.
- Entre las mujeres que, incluyendo al esposo/compañero, aceptaron haber tenido dos o más parejas sexuales, un mayor porcentaje tenía de 15 a 19 años de edad (0,9 por ciento). Por área de residencia, en el área urbana (0,4 por ciento). Por región natural, la Selva (0,6 por ciento) y, por departamento Loreto (1,3 por ciento) y Madre de Dios (1,0 por ciento).
- Considerando que el número de parejas sexuales es un factor de riesgo, se mantiene la consideración de que la mayoría de mujeres que adquirieron el VIH lo hicieron con su única pareja sexual.

CUADRO N° 11.17
PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2012
(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Número de parejas sexuales incluyendo esposo/compañero					Número de parejas sexuales excluyendo esposo/compañero				Número de mujeres
	Total	0	1	2 y más	Pro-medio	Total	0	1	Pro-medio	
Edad										
15-19	100,0	1,1	98,0	0,9	1,0	100,0	98,3	1,7	0,0	495
20-24	100,0	0,8	98,5	0,7	1,0	100,0	99,1	0,9	0,0	1 535
25-29	100,0	1,0	98,5	0,5	1,0	100,0	99,3	0,7	0,0	2 164
30-39	100,0	1,3	98,5	0,2	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	5 075
40-49	100,0	3,4	96,5	0,1	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	4 355
15-24	100,0	0,8	98,4	0,8	1,0	100,0	98,9	1,1	0,0	2 031
Nivel de educación										
Sin educación	100,0	5,0	94,9	0,1	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	470
Primaria	100,0	1,8	98,0	0,2	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	4 144
Secundaria	100,0	1,7	98,0	0,3	1,0	100,0	99,5	0,5	0,0	5 718
Superior	100,0	1,8	97,7	0,5	1,0	100,0	99,3	0,7	0,0	3 292
Quintil de riqueza										
Quintil inferior	100,0	1,6	98,2	0,1	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	2 477
Segundo quintil	100,0	1,6	98,0	0,4	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	2 916
Quintil intermedio	100,0	1,3	98,4	0,3	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	3 116
Cuarto quintil	100,0	2,4	97,5	0,1	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	2 682
Quintil superior	100,0	2,5	96,8	0,7	1,0	100,0	99,0	1,0	0,0	2 434
Total 2012	100,0	1,9	97,8	0,3	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	13 624

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO N° 11.18
PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES
A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012
(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Número de parejas sexuales incluyendo esposo/compañero					Número de parejas sexuales excluyendo esposo/compañero				Número de mujeres
	Total	0	1	2 y más	Pro-medio	Total	0	1	Pro-medio	
Área de residencia										
Urbana	100,0	2,0	97,6	0,4	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	9 542
Rural	100,0	1,5	98,4	0,2	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	4 082
Región natural										
Lima Metropolitana	100,0	2,7	96,9	0,4	1,0	100,0	99,5	0,5	0,0	3 689
Resto Costa	100,0	1,5	98,3	0,2	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	3 224
Sierra	100,0	1,7	98,1	0,2	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	4 720
Selva	100,0	1,3	98,1	0,6	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	1 992
Departamento										
Amazonas	100,0	1,3	98,6	0,2	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	227
Áncash	100,0	0,9	99,1	0,0	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	647
Apurímac	100,0	2,1	97,6	0,2	1,0	100,0	99,3	0,7	0,0	231
Arequipa	100,0	1,4	97,9	0,7	1,0	100,0	99,3	0,7	0,0	503
Ayacucho	100,0	1,7	98,0	0,3	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	435
Cajamarca	100,0	1,1	98,9	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	730
Cusco	100,0	1,4	97,8	0,7	1,0	100,0	98,6	1,4	0,0	605
Huancavelica	100,0	0,6	99,4	0,0	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	223
Huánuco	100,0	1,6	97,9	0,5	1,0	100,0	99,5	0,5	0,0	423
Ica	100,0	1,0	98,5	0,5	1,0	100,0	99,3	0,7	0,0	350
Junín	100,0	2,1	97,9	0,0	1,0	100,0	99,5	0,5	0,0	580
La Libertad	100,0	0,9	99,1	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	796
Lambayeque	100,0	2,5	97,4	0,1	1,0	100,0	99,9	0,1	0,0	538
Lima 1/	100,0	2,6	97,1	0,3	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	4 189
Loreto	100,0	2,2	96,6	1,3	1,0	100,0	99,0	1,0	0,0	500
Madre de Dios	100,0	2,0	97,0	1,0	1,0	100,0	98,7	1,3	0,0	78
Moquegua	100,0	2,9	96,4	0,7	1,0	100,0	98,7	1,3	0,0	76
Pasco	100,0	2,1	97,9	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	142
Piura	100,0	0,8	99,0	0,1	1,0	100,0	99,9	0,1	0,0	832
Puno	100,0	3,6	96,3	0,2	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	595
San Martín	100,0	0,5	98,7	0,8	1,0	100,0	99,0	1,0	0,0	442
Tacna	100,0	2,3	97,3	0,4	1,0	100,0	99,1	0,9	0,0	157
Tumbes	100,0	1,0	98,5	0,5	1,0	100,0	99,5	0,5	0,0	121
Ucayali	100,0	1,1	98,4	0,5	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	206
Total 2012	100,0	1,9	97,8	0,3	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	13 624

1/ Incluye el departamento de Lima y Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Conocimiento y uso del condón (Cuadros 11.19 y 11.20)

- Entre las mujeres que han oído hablar sobre el VIH/SIDA, el 98,9 por ciento conocía sobre el uso de condón, como una forma de prevenir enfermedades, pero solo el 10,3 por ciento utilizó el último mes. De las mujeres que lo usan como método anticonceptivo, el 2,3 por ciento no los usó en su última relación sexual.
- El 81,7 por ciento de mujeres conocía que hay fuente médica pública y un 2,9 por ciento fuente médica privada. El 76,7 por ciento, sabía que se adquiere en las farmacias contra un 1,2 por ciento que no conoce fuentes para obtenerlos.
- Es importante mencionar que las mujeres que reconocieron haber utilizado condones en el último mes fueron las que tuvieron educación superior (15,1 por ciento), pertenecientes al quintil superior de riqueza (14,9 por ciento) y, las solteras que han tenido relaciones sexuales (13,7 por ciento).
- En cuanto al grupo que usa el condón como método de planificación familiar pero que no los usó en su última relación sexual, fue mayor en mujeres con educación superior (4,0 por ciento), del quintil superior de riqueza y de 15 a 19 años de edad (3,3 por ciento, en ambos casos). Por área de residencia en la urbana (2,7 por ciento), por región natural en Lima Metropolitana (2,9 por ciento) y por departamentos en Moquegua (4,8 por ciento) y Cusco (4,2 por ciento).
- Se puede resumir que un porcentaje importante de mujeres entrevistadas conoce acerca de la existencia del condón, no obstante su uso frecuente y sostenido no es una práctica común, y fueron las mujeres solteras que han tenido relaciones sexuales, las que presentaron mayores porcentajes de uso en comparación con las divorciadas/separadas/ viudas y casadas o convivientes.

CUADRO N° 11.19
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO, FUENTE Y USO DEL CONDÓN, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2012
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Conoce sobre el condón 1/	Conoce fuente para el condón 2/					No conoce fuentes para el condón	Uso de condones		Usa condón para PF; pero no usó en última relación	Número de mujeres
		Fuente médica pública	Fuente médica privada	Farmacia	Otra fuente	Podría conseguir uno		El último mes	Antes		
Edad											
15-19	98,0	73,9	3,8	81,5	5,2	58,0	2,4	10,7	8,9	3,3	1 248
20-24	99,2	81,6	4,5	81,4	7,5	68,4	0,8	12,8	6,9	2,6	2 699
25-29	99,3	83,1	3,1	80,9	6,4	71,1	0,8	12,0	4,0	2,5	3 023
30-39	99,2	83,3	2,8	76,5	6,4	67,5	1,1	11,0	2,3	2,1	6 354
40-49	98,6	81,0	2,1	71,1	5,5	59,1	1,6	7,2	1,6	2,1	5 456
15-24	98,8	79,1	4,3	81,4	6,8	65,1	1,3	12,2	7,5	2,8	3 947
Estado conyugal											
Soltera ha tenido RS	99,4	71,1	5,3	88,9	9,7	68,1	0,8	13,7	12,1	2,9	3 308
Casada o Conviviente	98,8	84,9	2,3	72,8	5,3	64,4	1,3	10,6	1,1	2,4	13 094
Divorciada/Separada/Viuda	98,9	79,0	2,9	81,4	6,7	65,0	1,3	4,0	4,4	0,8	2 377
Nivel de educación											
Sin educación	91,6	84,8	0,2	24,8	1,0	31,5	9,1	2,7	0,0	0,3	410
Primaria	97,1	87,7	1,0	50,3	2,0	45,8	3,4	5,4	1,3	1,0	4 548
Secundaria	99,6	82,2	2,4	83,2	5,3	67,0	0,4	10,1	3,2	2,0	8 134
Superior	99,9	76,0	5,4	92,2	11,4	80,3	0,0	15,1	5,8	4,0	5 686
Quintil de riqueza											
Quintil inferior	95,4	91,7	1,1	32,1	1,4	40,6	5,4	3,6	0,8	0,7	2 581
Segundo quintil	99,0	89,7	1,4	67,1	2,4	56,9	1,6	7,3	2,4	1,6	3 622
Quintil intermedio	99,4	84,7	2,5	84,0	4,0	65,5	0,5	10,1	3,4	2,7	4 359
Cuarto quintil	99,5	78,6	3,0	88,4	6,9	73,9	0,3	12,9	4,0	2,6	4 160
Quintil superior	100,0	68,2	5,9	93,7	14,4	78,8	0,0	14,9	5,6	3,3	4 058
Total 2012	98,9	81,7	2,9	76,7	6,2	65,1	1,2	10,3	3,5	2,3	18 779
Total 2009	98,3	78,9	2,9	73,0	6,2	65,3	2,5	9,5	3,2	1,8	18 157

1/ Conocimiento para Planificación Familiar o para prevención de enfermedades.

2/ Para las usuarias actuales se incluye como fuente el último sitio donde obtuvo el condón.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO N° 11.20
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO, FUENTE Y USO DEL CONDÓN, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Conoce sobre el condón 1/	Conoce fuente para el condón 2/					No conoce fuentes para el condón	Uso de condones		Usa condón para PF; pero no usó en última relación	Número de mujeres
		Fuente médica pública	Fuente médica privada	Farmacia	Otra fuente	Podría conseguir uno		El último mes	Antes		
Área de residencia											
Urbana	99,5	78,5	3,4	86,7	7,6	71,0	0,4	11,8	4,2	2,7	14 286
Rural	97,0	91,9	1,4	44,8	1,9	46,6	3,8	5,5	1,2	1,1	4 494
Región natural											
Lima Metropolitana	99,8	72,6	5,0	92,3	11,5	74,8	0,1	14,5	5,0	2,9	6 009
Resto Costa	99,3	78,9	2,1	81,6	4,8	66,0	1,1	9,2	2,6	2,5	4 497
Sierra	97,9	88,8	2,0	58,4	2,3	54,4	2,5	8,4	2,9	1,9	5 716
Selva	98,8	92,3	1,7	72,2	5,3	64,9	1,1	6,9	2,7	1,7	2 557
Departamento											
Amazonas	98,3	93,3	2,4	61,2	1,6	58,8	2,4	5,2	2,6	3,2	269
Áncash	98,8	88,4	4,0	71,6	4,2	63,0	2,4	8,9	2,3	2,0	838
Apurímac	97,0	93,8	1,4	54,9	2,0	54,9	3,4	7,6	2,7	1,2	271
Arequipa	99,8	73,5	0,9	76,9	5,0	76,7	1,0	13,2	3,7	3,1	679
Ayacucho	98,5	94,9	3,1	56,3	3,3	46,4	1,6	6,5	2,0	1,7	516
Cajamarca	97,6	90,5	1,6	53,5	0,8	48,5	1,8	8,2	1,2	0,2	848
Cusco	98,1	92,7	3,8	68,3	2,2	59,5	2,3	9,9	3,9	4,2	728
Huancavelica	98,3	97,2	1,0	49,1	1,4	45,7	0,9	5,5	2,1	0,2	258
Huánuco	96,3	91,7	0,8	51,8	3,1	53,0	4,2	8,2	2,5	0,5	549
Ica	99,8	82,7	1,1	91,2	4,7	70,6	0,6	11,0	2,9	2,5	514
Junín	99,1	89,5	2,6	82,2	6,1	67,5	0,7	12,4	6,4	2,2	777
La Libertad	98,1	73,4	0,6	59,0	1,8	63,1	1,6	8,5	1,0	0,9	986
Lambayeque	98,9	71,1	0,9	78,4	3,9	62,8	1,0	7,9	2,8	3,8	724
Lima 3/	99,8	73,8	4,9	91,0	10,8	73,8	0,2	14,0	4,8	2,8	6 689
Loreto	97,5	94,4	1,6	60,6	11,7	61,5	1,3	4,8	3,8	1,9	661
Madre de Dios	99,4	84,6	1,6	84,9	5,5	70,2	1,2	10,9	3,8	2,6	103
Moquegua	98,5	90,2	1,3	76,0	3,6	65,1	1,6	10,5	5,1	4,8	108
Pasco	97,9	94,6	2,0	65,8	1,4	70,3	1,3	11,3	2,2	1,1	172
Piura	98,8	78,1	0,5	81,5	6,0	58,1	3,1	7,0	2,1	2,7	1 114
Puno	97,7	85,4	1,4	48,6	0,5	33,3	3,0	4,7	2,1	1,8	719
San Martín	99,6	91,1	2,1	85,1	2,3	72,4	0,6	5,4	2,6	1,9	586
Tacna	99,7	95,2	8,0	84,5	4,3	74,4	0,5	12,6	5,2	2,0	236
Tumbes	99,7	93,1	2,9	84,7	4,1	73,0	0,2	6,6	2,2	0,7	159
Ucayali	99,1	92,5	2,3	70,6	1,9	77,6	0,9	6,0	1,4	1,2	277
Total 2012	98,9	81,7	2,9	76,7	6,2	65,1	1,2	10,3	3,5	2,3	18 779
Total 2009	98,3	78,9	2,9	73,0	6,2	65,3	2,5	9,5	3,2	1,8	18 157

1/ Conocimiento para Planificación Familiar o para prevención de enfermedades.

2/ Para las usuarias actuales se incluye como fuente el último sitio donde obtuvo el condón.

3/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Uso de condón según tipo de compañero (Cuadros 11.21 y 11.22; Gráfico 11.7)

- El uso de condón entre las mujeres que tuvieron relaciones sexuales, en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista, de acuerdo con el tipo de compañero, muestra los siguientes porcentajes: un 11,7 por ciento usó condón con su esposo o compañero, en el año 2009 fue 9,8 por ciento; el 32,0 por ciento los usó con un compañero con el cual no vive, en el año 2009 fue 32,5 por ciento; y, un 15,5 por ciento usó condón con cualquier compañero, en el año 2009 fue 13,8 por ciento. Es decir, hubo un incremento en la mayoría de los casos, y el uso es mayor con parejas que no viven con ellas.
- El uso de condón con compañero con el cual no vive fue mayor entre las mujeres de 20 a 24 años de edad (39,3 por ciento), con educación superior (38,7 por ciento), del quintil superior de riqueza (38,0 por ciento) y las solteras que han tenido relaciones sexuales (37,5 por ciento). Por área de residencia fue más alta en la urbana (32,2 por ciento), por región natural en Lima Metropolitana (37,5 por ciento) y por departamento en Junín (39,6 por ciento).
- El uso de condón con cualquier compañero, ocurrió en mayor porcentaje en mujeres solteras que han tenido relaciones sexuales (37,5 por ciento), en mujeres con educación superior (24,4 por ciento) y, del quintil superior de riqueza (23,8 por ciento). Por área de residencia, fue en la urbana (18,5 por ciento), por región natural, en Lima Metropolitana (23,1 por ciento) y, por departamento en Lima (22,2 por ciento).
- Los datos encontrados en el año 2012 muestran que el uso de condón, cuya validez como método de protección de ITS y VIH está por demás comprobado, es mayor con parejas que no viven con las mujeres entrevistadas y que el conocimiento y acceso a estos, aumenta en tanto mayor sea el nivel educativo y las condiciones socioeconómicas en las que viven.

CUADRO N° 11.21
PERÚ: USO DEL CONDÓN POR TIPO DE COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2012

(Porcentaje)

Característica seleccionada	Usó condón con esposo o compañero		Usó con compañero con quien no vive		Usó condón con cualquier compañero	
	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres
Edad						
15-19	9,3	506	33,0	611	22,1	1 111
20-24	12,1	1 563	39,3	901	21,9	2 447
25-29	12,4	2 184	35,6	619	17,4	2 790
30-39	13,2	5 074	26,9	692	14,8	5 755
40-49	9,6	4 252	18,4	427	10,4	4 674
15-24	11,4	2 069	36,8	1 513	22,0	3 557
Estado conyugal						
Soltera ha tenido RS	*	4	37,5	2 274	37,5	2 278
Casada o Conviviente	11,6	13 344	30,7	59	11,6	13 365
Divorciada/Separada/Viuda	14,6	230	18,4	917	17,6	1 133
Nivel de educación						
Sin educación	3,7	451	*	12	3,6	462
Primaria	6,3	4 116	22,5	261	7,2	4 370
Secundaria	12,8	5 718	26,4	1 378	15,3	7 067
Superior	17,5	3 293	38,7	1 599	24,4	4 876
Quintil de riqueza						
Quintil inferior	3,9	2 467	17,8	179	4,8	2 641
Segundo quintil	8,5	2 928	26,1	406	10,6	3 322
Quintil intermedio	12,1	3 117	30,1	708	15,4	3 815
Cuarto quintil	16,7	2 663	31,6	839	20,1	3 493
Quintil superior	17,3	2 404	38,0	1 119	23,8	3 505
Total 2012	11,7	13 578	32,0	3 250	15,5	16 776
Total 2009	9,8	13 781	32,5	3 002	13,8	16 743

Nota: Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*), y los de 25-49 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

CUADRO N° 11.22
PERÚ: USO DEL CONDÓN POR TIPO DE COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA,
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012
(Porcentaje)


Ámbito geográfico	Usó condón con esposo o compañero		Usó con compañero con quien no vive		Usó condón con cualquier compañero	
	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres
Área de residencia						
Urbana	14,2	9 514	33,2	2 880	18,5	12 350
Rural	5,7	4 064	23,0	370	7,2	4 425
Región natural						
Lima Metropolitana	17,6	3 653	37,5	1 427	23,1	5 064
Resto Costa	10,5	3 225	26,6	740	13,5	3 955
Sierra	9,7	4 691	31,5	664	12,3	5 342
Selva	7,4	2 009	23,6	419	10,1	2 415
Departamento						
Amazonas	5,7	226	29,8	30	8,4	255
Áncash	9,4	651	27,4	124	12,3	775
Apurímac	8,6	228	36,4	26	11,2	253
Arequipa	17,6	501	23,9	118	18,7	615
Ayacucho	8,3	432	18,7	53	9,5	484
Cajamarca	8,6	731	(25,5)	72	10,1	803
Cusco	11,0	601	36,8	103	14,7	698
Huancavelica	4,3	224	(34,0)	29	7,7	252
Huánuco	8,0	420	36,9	70	12,0	488
Ica	13,0	346	26,6	100	16,1	443
Junín	16,1	571	39,6	137	20,5	707
La Libertad	9,3	798	16,9	142	10,4	940
Lambayeque	9,3	529	24,7	113	12,0	641
Lima 1/	16,8	4 150	37,2	1 532	22,2	5 664
Loreto	6,0	502	23,2	125	9,1	621
Madre de Dios	10,9	79	36,8	19	15,7	96
Moquegua	13,1	75	37,3	19	18,1	93
Pasco	12,3	140	32,6	18	14,7	158
Piura	7,9	852	27,5	135	10,6	984
Puno	5,2	582	(31,8)	57	7,6	639
San Martín	6,0	454	20,9	97	8,6	547
Tacna	15,7	157	36,0	50	20,3	206
Tumbes	7,3	123	27,0	19	10,0	141
Ucayali	5,3	206	14,7	66	7,6	271
Total 2012	11,7	13 578	32,0	3250	15,5	16 776
Total 2009	9,8	13 781	32,5	3002	13,8	16 743

Nota: Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*) y los de 25-49 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis.

1/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

GRÁFICO N° 11.7
 PERÚ: USO DE CONDÓN POR TIPO DE COMPAÑERO,
 SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2012
 (Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).