

PRINCIPALES INDICADORES

INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA	2009	2012
POBLACIÓN DE LA MUESTRA		
Mujeres de 15 a 49 años de edad	24 213	23 888
Área urbana	18 050	17 866
Área rural	6 162	6 022
Niñas y niños nacidos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta	9 305	8 804
Área urbana	5 994	5 773
Área rural	3 311	3 031
Sobrevivientes menores de cinco años de edad	9 088	8 651
Área urbana	5 880	5 679
Área rural	3 208	2 972
Niñas y niños vivos de 12 a 23 meses de edad	1 809	1 725
Niñas y niños vivos de 24 a 35 meses de edad	1 691	1 778
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA VIVIENDA Y DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Porcentaje)		
Viviendas con agua potable 1/	77,2	78,9
Área urbana 1/	85,5	85,0
Área rural 1/	60,1	65,7
Viviendas con servicio de desagüe 2/	55,6	59,3
Área urbana 2/	77,9	81,0
Área rural 2/	9,8	12,7
Mujeres en edad fértil con secundaria o más	74,0	75,2
Área urbana	85,2	85,3
Área rural	41,6	45,2
Mujeres en edad fértil con algún seguro de salud	51,0	57,0
Área urbana	47,0	53,2
Área rural	62,7	68,4
Mujeres en edad fértil con Seguro Integral de Salud (SIS)	27,4	31,5
Área urbana	17,1	21,1
Área rural	57,8	62,5
FECUNDIDAD		
Tasa Global de Fecundidad 3/	2,6	2,6
Área urbana 3/	2,3	2,3
Área rural 3/	3,6	3,5
Número medio de niñas y niños nacidos vivos de mujeres 40 a 49 años de edad	3,6	3,5
Área urbana	3,1	3,0
Área rural	5,2	4,9
OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD (Porcentaje)		
Mujeres actualmente unidas	57,1	57,0
Área urbana	53,3	53,4
Área rural	68,2	67,8
Mujeres que han estado unidas alguna vez	66,6	67,2
Área urbana	63,5	64,7
Área rural	75,6	74,5
Mujeres de 25-49 años de edad:		
Edad mediana a la primera unión	21,8	21,6
Área urbana	22,9	22,4
Área rural	19,4	19,7
Edad mediana al primer nacimiento	22,0	21,9
Área urbana	23,0	22,8
Área rural	20,0	20,0

continúa...

INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA	2009	2012
Duración media de la amenorrea postparto (en meses)	10,9	9,5
Duración media de la abstinencia postparto (en meses)	5,8	4,4
PREFERENCIAS REPRODUCTIVAS		
Porcentaje de mujeres actualmente unidas:		
Que no desea tener más hijas e hijos (Incluyendo mujeres esterilizadas)	63,3	62,0
Que desea postergar el nacimiento siguiente dos años o más	22,3	22,8
Número medio ideal de hijas e hijos para las mujeres de 15 a 49 años de edad	2,3	2,3
Área urbana	2,3	2,3
Área rural	2,5	2,4
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos por mujeres en edad fértil (MEF)		
Porcentaje de mujeres que conoce algún método de planificación familiar	99,3	99,9
Porcentaje de mujeres actualmente unidas:		
Que conoce algún método moderno		
Área urbana	99,9	100,0
Área rural	98,6	99,4
Que actualmente usa algún método		
Área urbana	74,6	75,8
Área rural	70,0	74,8
Que actualmente usa un método moderno		
Área urbana	53,3	54,8
Área rural	42,3	44,7
Que actualmente usa un método tradicional		
Área urbana	21,3	20,9
Área rural	27,8	30,2
Proporción de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar		
Área urbana	7,8	9,1
Área rural	10,4	11,2
MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ		
Tasa de mortalidad neonatal 4/	11,0	9,0
Tasa de mortalidad infantil 4/	20,0	17,0
Tasa de mortalidad de menores de cinco años de edad 4/	26,0	21,0
ATENCIÓN MATERNA		
Porcentaje de últimos nacimientos cuyas madres recibieron: 5/		
Atención prenatal de un profesional de salud calificado (médico, obstetrix y enfermera) durante el embarazo		
Área urbana	97,9	98,9
Área rural	87,1	90,0
Atención del parto en un establecimiento de salud		
Área urbana	93,4	95,7
Área rural	59,0	68,6
Atención del parto por un profesional de salud calificado (médico, obstetrix y enfermera)		
Área urbana	94,4	95,7
Área rural	61,0	69,6
Nacimientos por cesárea		
Área urbana	29,1	32,9
Área rural	7,5	10,8
Control postnatal en los primeros dos días		
Área urbana	94,8	97,4
Área rural	74,6	84,4

continúa...

INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA	2009	2012
VACUNACIÓN		
Porcentaje de niñas y niños de 18 a 29 meses de edad con tarjeta de vacunación	65,9	80,6
Área urbana	66,1	80,0
Área rural	65,7	81,7
Porcentaje de niñas y niños de 18 a 29 meses de edad que han recibido vacuna: 6/		
BCG	93,7	94,3
Área urbana	95,4	96,4
Área rural	90,2	90,3
DPT (las tres dosis)	72,9	83,3
Área urbana	73,5	83,8
Área rural	71,6	82,2
Polio (las tres dosis)	67,9	86,0
Área urbana	68,5	86,2
Área rural	66,8	85,5
Antisarampionosa	76,1	89,5
Área urbana	75,6	89,0
Área rural	77,1	90,5
Todas las vacunas 7/	51,4	73,9
Área urbana 7/	53,2	75,1
Área rural 7/	47,9	71,5
Prevalencia de enfermedades en menores de cinco años de edad (Porcentaje)		
Niñas y niños con diarrea 8/	14,0	12,3
Área urbana 8/	14,0	12,0
Área rural 8/	13,9	12,8
Niñas y niños con diarrea tratados con sobres de rehidratación oral SRO	32,0	30,9
Área urbana	38,9	35,2
Área rural	19,2	23,2
Niñas y niños enfermos con IRA	6,4	13,9
Área urbana	5,7	12,9
Área rural	7,7	15,7
NUTRICIÓN EN LA NIÑEZ (Porcentaje)		
Niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón OMS)	23,8	18,1
Área urbana	14,2	10,5
Área rural	40,3	31,9
Niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón NCHS)	18,3	13,5
Área urbana	9,9	7,3
Área rural	32,8	24,6
Niñas y niños menores de cinco años de edad con anemia	37,2	32,9
Área urbana	33,2	28,6
Área rural	44,1	40,7
Niñas y niños menores de cinco años de edad que recibió suplementos de hierro en los últimos siete días	11,9	14,9
Área urbana	10,4	13,3
Área rural	14,6	18,0
Niñas y niños menores de cinco años de edad que recibió suplementos de vitamina "A" los últimos seis meses	5,8	3,1
Área urbana	3,4	1,8
Área rural	10,2	5,6
Niñas y niños nacidos con bajo peso al nacer (menos de 2,5 kg.)	6,4	6,9
Área urbana	6,3	6,5
Área rural	6,5	7,5
Niñas y niños menores de seis meses de edad con lactancia exclusiva	68,5	67,6
Niñas y niños menores de cuatro meses de edad amamantados	99,3	98,8
Duración mediana de la lactancia (en meses) 9/	20,8	20,1

continúa...

INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA	2009	2012
NUTRICIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Porcentaje)		
Mujeres que recibieron suplemento de hierro en el último nacimiento	78,1	87,2
Área urbana	79,3	88,8
Área rural	75,6	84,0
Mujeres que tomó hierro por 90 días o más durante el embarazo	30,3	44,7
Área urbana	32,8	48,2
Área rural	25,3	37,5
Mujeres con anemia	21,0	17,7
Área urbana	20,7	16,3
Área rural	22,1	21,7
Madres con talla menor de 145 cms.	10,4	9,5
Área urbana	8,4	7,7
Área rural	16,0	14,8
PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Porcentaje)		
Con una ITS	0,6	0,7
Área urbana	0,6	0,9
Área rural	0,5	0,4
Con flujo vaginal	12,8	12,2
Área urbana	13,0	12,8
Área rural	12,4	10,4
Con úlceras, llagas genitales	2,1	1,8
Área urbana	2,4	1,9
Área rural	1,6	1,5
VIOLENCIA FAMILIAR A MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS (Porcentaje)		
Experimentaron violencia física por el esposo o compañero	38,8	36,4
Área urbana	39,3	37,3
Área rural	37,7	34,2
Soportó violencia sexual	8,0	8,7
Área urbana	7,8	8,6
Área rural	8,4	9,0
Fueron agredidas alguna vez bajo los efectos del alcohol por el esposo o compañero	57,1	56,7
Área urbana	53,7	54,0
Área rural	64,3	63,3
Mujeres de 15-49 años de edad que fueron maltratadas por otras personas (Porcentaje)	20,3	16,0
Área urbana	23,0	18,0
Área rural	13,4	10,7

1/ Comprende agua potable dentro, fuera de la vivienda y pilón/grifo público.

2/ Servicio con desagüe comprende el servicio higiénico conectado a red pública dentro y fuera de la vivienda.

3/ Tomando como base los nacimientos ocurridos durante los tres años anteriores a la encuesta.

4/ Defunciones por cada 1 000 nacidos vivos para el período de diez años precedente a la encuesta, 2009 y 2011-2012.

5/ Tomando como base los nacimientos ocurridos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta.

6/ Información obtenida del carnet de vacunación y de la información proporcionada por la madre.

7/ Incluye BCG, tres dosis de polio, tres dosis de DPT y antisarampionosa.

8/ Niñas y niños menores de cinco años de edad cuyas madres declararon que aquéllos tuvieron diarrea durante las dos semanas anteriores a la encuesta.

9/ Calculado por el método de Prevalencia/ Incidencia.