



Capítulo 10

Conocimiento del VIH

10. CONOCIMIENTO DEL VIH

A las mujeres entrevistadas que manifestaron haber oído hablar sobre la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), se les preguntó si había algo que una persona pueda hacer para evitar infectarse con el VIH y sobre las formas en que se puede transmitir el virus.

CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA DE EVITAR EL VIH


Usar condones

El uso del condón como forma de evitar el VIH, fue mencionado por el 84,4% de las mujeres residentes en el departamento de Lima Metropolitana. En comparación al año 2023 no se aprecia grandes diferencias.

Limitar el número de parejas sexuales

En relación al conocimiento de las formas de importancia programática de evitar el VIH, el 87,8% de las mujeres respondió “limitar el número de parejas sexuales o mutua fidelidad”. En comparación al año 2023 ha tendido a incrementarse (3,2 puntos porcentuales).

GRÁFICO N° 10.1
LIMA METROPOLITANA: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD POR CONOCIMIENTO
DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA DE EVITAR EL VIH, 2023 Y 2024
(Porcentaje)



Nota:

Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$)

*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

1/ Incluye ser mutuamente fiel.


Cuadro base: Cuadro 10.1 del Informe Departamental ENDES 2024.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

En cuanto a los síntomas y signos específicos de las ITS, de los cuales tenían conocimiento las mujeres entrevistadas del departamento de Lima Metropolitana, destaca el enrojecimiento/picazón en genitales (34,1%), seguido de verrugas genitales (30,2%), úlceras / llagas genitales (25,0%), secreción mal oliente (19,3%), inflamación o hinchazón en genitales (18,2%), y secreción por genital (15,4%).

GRÁFICO N° 10.2
LIMA METROPOLITANA: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), 2024
(Porcentaje)



1/ A partir del año 2004 en la variable secreción por genital incluye secreción de flujo por la vagina y secreción/goteos en genitales.
Cuadro base: Cuadro 10.5 del Informe Departamental ENDES 2024.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CONOCIMIENTO, FUENTE Y USO DEL CONDÓN

La conducta sexual individual y el uso de condón son determinantes claves del estatus de riesgo de contraer ITS, al analizar esta información de manera agregada a nivel poblacional, es posible identificar el contexto en el que deben diseñarse e implementarse los programas de prevención y atención del VIH e ITS. En la Encuesta 2024, se preguntó a las mujeres acerca del uso de condón en su última relación sexual y sobre el conocimiento de fuentes para su obtención.

Conoce fuente para el condón


El 63,6% de mujeres residentes en Lima Metropolitana conoce que hay fuente médica pública para obtener el condón, un 94,2% conoce que se puede obtener condones en una farmacia. El 84,3%, de las mujeres declararon que podrían conseguir uno.

En comparación con el año 2023, se aprecia una tendencia a la disminución en cuanto al conocimiento de las mujeres respecto a que se puede conseguir un condón en la farmacia o desde una fuente médica pública.

Uso de condones

El 14,1% de las mujeres entrevistadas residentes en Lima Metropolitana, declararon que usaron condón en el último mes y el 7,2% lo uso antes.

En comparación con el año 2023, se aprecia tendencia al incremento en el uso del condón en el último mes.



Cuadro base: Cuadro 10.7 del Informe Departamental ENDES 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.