



Capítulo 10

Conocimiento del VIH

10. CONOCIMIENTO DEL VIH

A las mujeres entrevistadas que manifestaron haber oído hablar sobre la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), se les preguntó si había algo que una persona pueda hacer para evitar infectarse con el VIH y sobre las formas en que se puede transmitir el virus.

CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA DE EVITAR EL VIH

Usar condones

El uso del condón como forma de evitar el VIH, fue mencionado por el 79,2% de las mujeres residentes en el departamento de Puno. En comparación al año 2023 no se observan diferencias significativas.

▣ Área de residencia

Fue mayor en mujeres que declararon que el “uso del condón” es una de las formas de importancia programática de evitar el VIH residentes en el área rural (82,2%).


Limitar el número de parejas sexuales

En relación al conocimiento de las formas de importancia programática de evitar el VIH, el 81,3% de las mujeres respondió “limitar el número de parejas sexuales o mutua fidelidad”. En comparación con el año 2023, se aprecia una diferencia de 3,1 puntos porcentuales entre ambos años.

▣ Área de residencia

Según el área de residencia, se advierte mayor porcentaje de mujeres residentes en el área rural que respondieron que el “limitar el número de parejas sexuales o mutua fidelidad” es una forma de evitar el VIH, (81,9%), en comparación con las de residencia en área urbana (80,8%).

GRÁFICO N° 10.1
PUNO: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD POR CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA
PROGRAMÁTICA DE EVITAR EL VIH, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2023 Y 2024
 (Porcentaje)



Nota:

Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

1/ Incluye ser mutuamente fiel.


Cuadro base: Cuadro 10.1 del Informe Departamental ENDES 2024.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

En cuanto a los síntomas y signos específicos de las ITS, de los cuales tenían conocimiento las mujeres entrevistadas del departamento de Puno, destaca enrojecimiento/picazón en genitales (25,1%), seguido de secreción mal oliente (22,2%), pérdida de peso (20,3%), molestia al orinar (16,0%), verrugas genitales (13,2%) y secreción genital (10,9%). Entre otras repuestas que fueron mencionadas en menores porcentajes.

GRÁFICO N° 10.2
PUNO: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), 2024
 (Porcentaje)



1/ A partir del año 2004 en la variable secreción por genital incluye secreción de flujo por la vagina y secreción/goteos en genitales.
 Cuadro base: Cuadro 10.4 del Informe Departamental ENDES 2024.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CONOCIMIENTO, FUENTE Y USO DEL CONDÓN

La conducta sexual individual y el uso de condón son determinantes claves del estatus de riesgo de contraer ITS, al analizar esta información de manera agregada a nivel poblacional, es posible identificar el contexto en el que deben diseñarse e implementarse los programas de prevención y atención del VIH e ITS. En la Encuesta 2024, se preguntó a las mujeres acerca del uso de condón en su última relación sexual y sobre el conocimiento de fuentes para su obtención.


Conoce fuente para el condón

El 83,7% de mujeres residentes en el departamento de Puno conoce que hay fuente médica pública para el condón, un 72,3% conoce que se puede obtener condones en una farmacia. El 52,9%, de las mujeres declararon que podrían conseguir uno.

En comparación con el año 2023, se aprecia una tendencia al aumento en cuanto al conocimiento de las mujeres respecto a que se puede conseguir un condón en una fuente médica pública, y que disminuye en aquellas mujeres que podrían conseguir un condón.

Uso de condones

El 8,6% de las mujeres entrevistadas residentes del departamento de Puno, declararon que usaron condón en el último mes y el 1,8% lo uso antes. En comparación con el año 2023, se aprecia que disminuye en ambos casos.



Cuadro base: Cuadro 10.7 del Informe Departamental ENDES 2024.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.